4263 FIRST AID KIT- 4263 first aid kit Honeywell Safety Products USA, INC

Disclaimer: This drug has not been found by FDA to be safe and effective, and this labeling has not been approved by FDA. For further information about unapproved drugs, click here.

0498-4263: First Aid Kit (Neomycin, EW, BZK wipes, aypanal- SF00000637)

Eyesaline Active ingredient

Sterile Water 99%

Eyesaline *Purpose*

Eyewash

Eyesaline

Uses

• for flushing the eye to remove loose foreign material, air pollutants or chlorinated water

Eyesaline *Warnings*

For external use only-

Obtain immediate medical treatment for all open wounds in or near eyes.

To avoid contamination, do not touch tip of container to any surface.

Do not reuse. Once opened, discard.

Do not use

- if solution changes color or becomes cloudy
- if you have open wounds in or near the eyes, get medical help right away.

Stop use and ask a doctor if

- you experience eye pain
- changes in vision
- continued redness or irritation of the eye
- condition worsens or persists

Keep out of reach of children

If swallowed, get medical help or contact a Poison Control Center right away.

Eyesaline *Directions*

- remove contacts before using
- twist top to remove
- flush the affected area as needed
- control rate of flow by pressure on the bottle
- if necessary, continue flushing with emergency eyewash or shower

Eyesaline Inactive ingredients

sodium chloride, sodium phosphate dibasic, sodium phosphate monobasic

Eyesaline *Questions*

1-800-430-5490 Honeywell Sadety Products USA, Inc. Smithfield, RI 02917

Aypanal Active ingredient

Acetaminophen 325 mg

Aypanal *Purpose*

Pain reliever/ fever reducer

Aypanal

Uses

• temporarily relieves minor aches and pains due to the common cold and headache - temporarily reduces fever

Keep out of reach of children.

Keep out of reach of children.

Aypanal Warnings

Liver warning: This product contains acetaminophen. Severe liver damage may occur if you take:

• more than 4,000 mg in 24 hours, which is the maximum daily amount

- child takes more than 5 doses in 24 hours, which is the maximum daily amount
- taken with other drugs containing acetaminophen
- adult has 3 or more alcoholic drinks every day while using this product:

Allergy alert: Acetaminophen may cause severe skin reactions. Symptoms may include:

- skin reddening
- blisters
- rash
- If a skin rash occurs, stop use and seek medical help right away.

Do not use

- with any other drug containing acetaminophen (prescription or nonprescription).
- If you are not sure whether a drug contains acetaminophen, ask a doctor or pharmacist.

Ask a doctor before use if you have

• liver disease

Ask a doctor or pharmacist before use if

• you are taking the blood thinning drug warfarin

Stop using and ask a doctor if

- pain gets worse or lasts more than 10 days in adults
- pain gets worse or lasts more than 5 days in children under 12 years
- fever gets worse or lasts more than 3 days
- redness or swelling is present
- new symptoms occur

If pregnant or breast-feeding

If pregnant or breast-feeding, ask a health professional before use.

Overdose warning

- In case of accidental overdose, get medical help or contact a Poison Control Center right away.
- Prompt medical attention is critical for adults as well as for children even if you do not notice any signs or symptoms.

Aypanal *Directions*

do not take more than directed (see overdose warning)

adults and children 12 years of age or older

- take two tablets every 4-6 hours while symptoms last
- do not take more than 12 tablets in 24 hours

children 6 to under 12 years of age

- take 1 tablet every 4-6 hours while symptoms last
- do not take more than 5 tablets in 24 hours

children under 6 years consult a doctor

Aypanal Other information

- store at room temperature 15 0 to 30 0 C (59 0 86 0 F)
- TAMPER EVIDENT PACKETS- DO NOT USE IF OPEN OR TORN

Aypanal Inactive ingredients

corn starch, microcrystalline cellulose, povidone, sodium starch glycolate, stearic acid

Aypanal *Questions*

1-800-430-5490

Neomycin Active ingredient

Neomycin sulfate (5 mg equivalent to 3.5 mg Neomycin base)

Neomycin *Purpose*

First aid antibiotic

Neomycin

Uses

• first aid to help prevent infection in - minor cuts - scrapes - burns

Do not use

- in the eyes
- over large areas of the body

Neomycin *Warnings*

For external use only

Do not use

- in the eyes
- over large areas of the body

Ask a doctor before use if you have

- deep or puncture wounds
- animal bites
- serious burns

Stop use and ask a doctor if

- a rash or other allergic reaction develops
- you need to use longer than 1 week

Stop use and ask a doctor if

- the condition persists or gets worse
- a rash or other allergic reaction develops
- you need to use longer than 1 week

Keep out of reach of children

• If swallowed, get medical help or contact a Poison Control Center right away

Neomycin *Direction*

- clean the affected area
- apply a small amount of the product (an amount equal to the surface area of the tip of a finger) on the area 1 to 3 times daily
- may be covered with a sterile bandage

Neomycin Other information

store at 15 0 to 25 0 C (59 0 to 77 0 F)

Neomycin Inactive ingredient

petrolatum

Neomycin *Questions?*

1-800-430-5490

BZK

Active ingredient

Benzalkonium chloride 0.13%

BZK Purpose

First aid antiseptic

BZK

Uses

• first aid to help prevent infection in minor cuts, scrapes and burns

BZK

Warnings

For external use only

Do not use

- in or near the eyes
- over large areas of the body

Ask a doctor before use if you have

- deep or puncture wounds
- animal bites
- serious burns

When using this product

• do not use longer than one week unless directed by a doctor

Stop use and ask a doctor if

• the condition persists or gets worse

Keep out of reach of children

If swallowed, get medical help or contact a Poison Control Center right away

BZK Directions

- clean the affected area
- spray a small amount of this product on the area 1 to 3 times daily
- may be covered with a sterile bandage
- if bandaged, let dry first

Other information

- shake well
- store at room temperature 15 0 -30 0 C (59 0 -86 0 F)

BZK Inactive ingredients

iazolidinyl urea, edetate disodium, glycerin, hypromellose, methylparaben, octoxynol 9, propylene glycol, propylparaben, trolamine, water

BZK Questions

1-800-430-5490

Eyesaline Principal Display Panel




Datos de medicamento (Para Ingrediente Activo	Propósito
	Lavaojos
Usos	
para el lavado de ojo para quitar las particulas	sueltas y extrañas,
los contaminantes aeros, o agua de cloruro	
Advertencias	onto módico
Para el uso externo sólo - Obtenga tratami inmediato para todas las heridas abiertas en	
Para evitar la contaminación, no toque la pun	ta del envase con
ninguna superficie. No vuelva a usar. Vez abie	erto, descarte.
No se use • si la solución se enturbia o ca	
 si tiene heridas abiertas en o cerca del ojo, o de inmediato 	otenga ayuda medica
Deje de usar y consulte a un médico si:	
 experimenta dolor de ojo cambio de vis 	sión
 rojez continuo o irritación del ojo 	
la condición empeora o persiste	
Manténgase fuera del alcance de los niños En caso de ingestión accidental, obtenga ate	nción médica o llame
a un Centro de control de envenenamiento in	mediatamente.
Instrucciones	
 quitese los lentes de contacto antes de usar 	la solución
tuerza la tapa para quitar aniungue al éres afectado paguín os pagasit	
 enjuague el área afectada según se necesit controle el chorro haciendo presión el la bo 	tella
 si es necesario, sigue enjuagado con un lavaojos 	o ducha de emergencia
Ingredientes inactivos	
cloruro de sodio, fosfato de sodio dibásico, fosfat	o de sodio monobásico
¿Preguntas? Llame al 1-800-430-5490	
Honeywell Safety Products USA, Inc. Smithfie	ld, RI, 02917
Information	
Information Usages	
Usages Pour le rinçage des yeux afin d'enlever un co	rps _. étranger,
Usages	rps étranger, lorée.
Usages Pour le rinçage des yeux afin d'enlever un co des polluants atmospheriques oú de l'eau ch Advertissements	lorée.
Usages Pour le rinçage des yeux afin d'enlever un co des polluaris atmospherques où de l'eau ch Advertissements Pour usage externe seulement - Obtenir in	lorée . médiatement des
Usages Pour le rinçage des yeux afin d'enlever un co des polluants atmospherques ou de l'eau ch Advertissements Pour usage externe seulement - Obtenir im soins médicaux pour toutes les plaies ouvert yeux. Pour viter toute contamination, ne pai	lorée . médiatement des es dans ou près des s toucher la pointe du
Usages Pour le rinçage des yeux afin d'enlever un co des polluants atmospherques où de l'eau ch Advertissements Pour usage externe seulement - Obterir in soins médicaux pour toutes les plaies ouvert yeux. Pour éviter toute contamination, ne pas récipient à rimporte quelle surface. Ne pas r	lorée . médiatement des es dans ou près des s toucher la pointe du
Usages Pour le rinçage des yeux afin d'enlever un co des polituants atmosphenques ou de l'eau ch Advertissements Pour usage externs seulement - Obtenir im soins médicaux pour toutes les plaies ouvert yeux. Pour viter toute contamination, ne pai récipient à n'importe quelle surface. Ne pas r ouvert, jetez-les.	lorée . médiatement des es dans ou près des s toucher la pointe du
Usages Pour le rinçage des yeux afin d'enlever un co des polluants atmospherques ou de l'eau ch Advertissements Pour usage externs seulement - Obtenir in sons médicaux pour toutes les plaies ouvert yeux. Pour viter toute contamination, ne pas récipient à n'importe quelle surface. Ne pas r ouvert, jetz-les. Ne pas utiliser • si la solution a chancé de couleur ou si elle	lorée . médiatement des es dans ou près des s toucher la pointe du éutiliser. Une fois est brouillée
Usages Pour le rinçage des yeux afin d'enlever un co des polluants atmospherques où de l'eau ch Advertissements Pour usage externe seulement - Obterir in soins médicaux pour toutes les plaies ouvert yeux. Pour éviter toute contamination, ne pas récipient à n'importe quelle surface. Ne pas s ouvert, jetez-les. Ne pas utiliser • si a solution a changé de couleur ou si elle • si vous avez des plaies ouvertes aux yeux o	lorée . médiatement des es dans ou près des s toucher la pointe du éutiliser. Une fois est brouillée
Usages Pour le rinçage des yeux afin d'enlever un co des poliulants atmospherques ou de l'eau ch Advertissements Pour usage externs seulement - Obtenir im sons médicaux pour toutes les plaies ouvert yeux. Pour viter toute contamination, ne pai récipient à n'importe quelle surface. Ne pas r ouvert, jetze-les. Ne pas utiliser - si la solution a changé de couleur ou si elle - si vous avez des plaies ouvertes aux yeux o consultez immédiatement un médecin	lorée . médiatement des es dans ou près des toucher la pointe du éutiliser. Une fois est brouillée a à proximité,
Usages Pour le rinçage des yeux afin d'enlever un co des polluants atmospherques où de l'eau ch Advertissements Pour usage externe seulement - Obtenir im soins médicaux pour toutes les plaies ouvert yeux. Pour éviter seulement - Obtenir in récipient à n'importe quelle sufface. Ne pas i ouvert, jettez-les. Ne pas utiliser • si a solution a changé de couleur ou si elle • si vous avez des plaies ouvertes aux yeux o consultez immédiatement un médecin Cesser d'utiliser la solution et consulter u	lorée . médiatement des se dans ou près des s toucher la pointe du éutiliser. Une fois est brouillée a proximité, n médecin
Usages Pour le rinçage des yeux afin d'enlever un co des pollutants atmospheriques où de l'eau ch Advertissements Pour usage externs esulement - Obtenir in sons médicaux pour toutes les plaies ouvert yeux, Pour eviter toute contamination, ne pas récipient à n'importe quelle surface. Ne pas r ouvert, jetez-les. Ne pas utiliser • si la solution es plaies ouvertes auxour ou si elle • as la solution es plaies ouvertes auxour cesser d'utiliser in solution et consulter u vous resertez ume douteur ou calier • rouser un ration persistante des veux	lorée . médiatement des es dans ou près des toucher la pointe du éutiliser. Une fois est brouillée a à proximité,
Usages Pour le rinçage des yeux afin d'enlever un co des polluants atmospherques ou de l'eau ch Advertissements Pour usage externs esulement - Obtenir im sons médicaux pour toutes les plaies ouvert yeux. Pour viter toute contamination, ne pas récipient à n'importe quelle surface. Ne pas r ouvert, jetz-les. Ne pas utiliser • si la solution a changé de couleur ou si elle • si vous avez des plaies ouvertes aux yeux o consultez immédiatement un médecin Cesser d'utiliser la solution et consulter y vous ressentez une douleur oculaire • si • rougeur ou inflation persistante des yeux • condition empire ou persiste	lorée . médiatement des se dans ou près des s toucher la pointe du éutiliser. Une fois est brouillée a proximité, n médecin
Usages Pour le rinçage des yeux afin d'enlever un co des pollutants atmospheriques où de l'eau ch Advertissements Pour usage externe seulement - Obtenir in sons médicaux pour toutes lepides ouvert yeux, Pour eviter toute contamination, ne pas récipient à n'importe quelle surface. Ne pas r ouvert, jettez-les. Ne pas utiliser - si la solution es plaies ouvertes aux yeux o consultez immédiatement un médecin Cesser d'utiliser la solution et consulter u vous ressertez une douteur ou callet s'ougeur ou infration persiste carder hors de la porté des enfants.	lorée . médiatement des sé dans ou près des toucher la pointe du éutiliser. Une fois est brouillée a proximité, n médecin votre vision change
Usages Pour le rinçage des yeux afin d'enlever un co des polluants atmospherques ou de l'eau ch Advertissements Pour usage externs esulement - Obtenir im sons médicaux pour toutes les plaies ouvert yeux. Pour viter toute contamination, ne pas récipient à n'importe quelle surface. Ne pas r ouvert, jetz-les. Ne pas utiliser • si la solution a changé de couleur ou si elle • si vous avez des plaies ouvertes aux yeux o consultez immédiatement un médecin Cesser d'utiliser la solution et consulter y vous ressentez une douleur oculaire • si • rougeur ou inflation persistante des yeux • condition empire ou persiste	lorée . médiatement des sé dans ou près des toucher la pointe du éutiliser. Une fois est brouillée a proximité, n médecin votre vision change
Usages Pour le rinçage des yeux afin d'enlever un co des polluants atmospherques ou de l'eau ch Advertissements Pour usage externs esulement - Obtenir im soins médicaux pour toutes les plaies ouvert yeux. Pour vitrer toute contamination, ne pas récipient à n'importe quelle surface. Ne pas rouvert, jetez-les. Ne pas utiliser : si la solution a changé de couleur ou si elle : si vous avez des plaies ouvertes aux yeux o consultez immédiatement un médicin Cesser d'utiliser la solution et consulter u vous ressertez une douter oculaire - si : ouqueur ou irritation persistante des yeux : condition empire ou persiste Garder hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, communiquer immédiateme	lorée . médiatement des sé dans ou près des toucher la pointe du éutiliser. Une fois est brouillée a proximité, n médecin votre vision change
Usages Pour le rinçage des yeux afin d'enlever un co des polluants atmospherques ou de l'eau ch Advertissements Pour usage externs seulement - Obtenir im soins médicaux pour toutes les plaies ouvert yeux. Pour vitrer toute contamination, ne par récipient à n'importe quelle surface. Ne pas r ouvert, jettez-les. Ne pas utiliser - si la solution a changé de couleur ou si elle - si vous avez des plaies ouvertes aux yeux o consultez immédiatement un médicain Cesser d'utiliser la solution et consuter u vous ressertez une douter oculaire es e condition empire ou persiste Garder hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, communiquer immédiaten ou avec un centre antipoison. Mode d'emploi - enlever les verres de contact avant l'utilisat	lorée . médiatement des sé dans ou près des toucher la pointe du éutiliser. Une fois est brouillée a proximité, n médecin votre vision change ment avec un médecir on • dévisser le
Usages Pour le rinçage des yeux afin d'enlever un co des polluants atmosphenques ou de l'eau ch Advertissements Pour usage externs seulement - Obtenir im sons médicaux pour toutes les plaies ouvert yeux. Pour viter toute contamination, ne pai- récipient à n'importe quelle surface. Ne pas r ouvert, jetze-les. Ne pas utiliser • si la solution a changé de couleur ou si elle • si vous avez des plaies ouvertes aux yeux o consultez immédiatement un médecin Cesser d'utiliser la solution et consulter u vous ressentez une doudeur oculaire • si • rougeur ou irritation persistante des yeux • condition empte ou persiste Garder hors de la portée des enfants. En cas d'ingeston, communiquer immédiater ou avec un centre antipoison. Mode d'emploi	lorée . médiatement des se dans ou près des se dans ou près des toucher la pointe du éutiliser. Une fois est brouillée a proximité, n médecin votre vision change ment avec un médecir on • dévisser le chée selon les
Usages Pour le rinçage des yeux afin d'enlever un co des pollutants atmospheriques où de l'eau ch Advertissements Pour usage externe seulement - Obtenir in sons médicaux pour toutes les plaies ouvert yeux. Pour eviter toute contamination, ne pas récipient à n'importe quelle surface. Ne pas r ouvert, jettez-les. Ne pas utiliser - si la solution es plaies ouvertes aux yeux o consultez immédialement un médecin Cesser d'utiliser la solution et consulter u - vous ressertez une douteur ou sei les rougeur ou intration persiste Garder hors de la porté des enfants. En cas d'ingestion, communiquer immédiale ou avec un centre antipoison.	lorée . médiatement des sé dans ou près des toucher la pointe du éutiliser. Une fois est brouillée a proximité, a médecin votre vision change nent avec un médecin on • dévisser le cichée selon les la solution en
Usages Pour le rinçage des yeux afin d'enlever un co des pollutants atmospherques où de l'eau ch Advertissements Pour usage externs esulement - Obtenir in soins médicaux pour toutes les plaies ouvert yeux. Pour eviter toute contamination, ne par récipient à n'importe quelle surface. Ne pas s ouvert, jettez-les. Ne pas utiliser - si la solution a changé de couleur ou si elle - si vous avez des plaies ouvertes aux yeux co consultez îmmédiatement un médical. Cesser d'utiliser la solution et consulter u consultez immédiatement un médical. Cesser d'utiliser la solution et consulter u rouger ou infraiton persistante des yeux - condition empire ou persiste Garder hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, communiquer immédiate ou avec un centre antipoison.	lorée . médiatement des se dans ou près des se dans ou près des toucher la pointe du éutiliser. Une fois est brouillée a proximité, n médecin votre vision change ment avec un médecir on • dévisser le ta solution en ercée sur le contenan
Usages Pour le rinçage des yeux afin d'enlever un co des polluants atmosphenques où de l'eau ch Advertissements Pour usage externs esulement - Othenir im sons medicaux pour toutes les plaies ouvert yeux. Pour viter toute contamination, ne pai récipient à n'importe quelle surface. Ne pas r ouver, jetz-les. Ne pas utiliser • si la solution a changé de couleur ou si elle • si vous avez des plaies ouvertes aux yeux o consulte zimmédiatement un médecin Cesser d'utiliser la solution et consulter u vous ressentez une douder oculaire • si • rougeur ou irritation persistante des yeux • condition empire ou persiste Garder hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, communiquer immédiatem ou avec un centre antipoison. • Mode d'emploi	lorée . médiatement des ss dans ou près des toucher la pointe du éutiliser. Une fois est brouillée a proximité, n médecin votre vision change ment avec un médecin on • dévisser le la solution en ercée sur le contenant
Usages Pour le rinçage des yeux afin d'enlever un co des polluants atmospherques ou de l'eau ch Advertissements Pour usage externs seulement - Othenir im soins médicaux pour toutes les plaies ouvert yeux. Pour viter toute contamination, ne par récipient à n'importe quelle surface. Ne pas r ouvert, jetz-les. Ne pas utiliser • si la solution a changé de couleur ou si elle • si vous avez des plaies ouvertes aux yeux o consultez immédiatement un médecin Cesser d'utiliser la solution et consulter u vous ressentez une douteur coulaire • si • rougeur ou inftation persistante des yeux • condition empire ou persiste Garder hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, communiquer immédiateme ou avec un centre antipoison. Mode d'emploi • enlever les verres de contact avant l'utilisat bouchon pour l'enlever • rincer la zone too besoins • ajuster le débit d'écoulement de augmentant ou enfeduisant la pression com ouclaire d'urgence ou une douche	lorée . médiatement des sé dans ou près des toucher la pointe du éutiliser. Une fois est brouillée a proximité, n médecin votre vision change ment avec un médecir on • dévisser le chée selon les la solution de rincage ium, phosphate
Usages Pour le rinçage des yeux afin d'enlever un co des politiants atmosphenques ou de l'eau ch Advertissements Pour usage externs seulement - Obtenir im soins médicaux pour toutes les plaies ouvert yeux. Pour vitre toute contamination, ne pai récipient à n'importe quelle surface. Ne pas s ouvert, jettez-les. Ne pas utiliser • si la solution a changé de couleur ou si elle • si vous avez des plaies ouvertes aux yeux o consultez immédiatement un médécin Cesser d'utiliser la solution et consulter u vous ressertéz une doudeur oculaire • sous ressertéz une doudeur oculaire • sous ressertéz une doudeur oculaire • sous ressertés une doudeur oculaire • sous ressertés de context des yeux • condeur ou infalion persiste En cas d'ingestion persiste • condeur de la porté des enfants. En cas d'ingestion comme injuer immédiate obuchon pour l'enlever - rincer la zone to besoins • ajuster le débit d'écoulement de augmentant ou en réduisant la pression ex • oculaire d'urgence ou une douche	lorée . médiatement des sé dans ou près des toucher la pointe du éutiliser. Une fois est brouillée a proximité, n médecin votre vision change ment avec un médecin on • dévisser le chée selon les la solution de rinçage ium, phosphate
Usages Pour le rinçage des yeux afin d'enlever un co des polluants atmospherques ou de l'eau ch Advertissements Pour usage externs seulement - Othenir im soins médicaux pour toutes les plaies ouvert yeux. Pour viter toute contamination, ne par récipient à n'importe quelle surface. Ne pas r ouvert, jetz-les. Ne pas utiliser • si la solution a changé de couleur ou si elle • si vous avez des plaies ouvertes aux yeux o consultez immédiatement un médecin Cesser d'utiliser la solution et consulter u vous ressentez une douteur coulaire • si • rougeur ou inftation persistante des yeux • condition empire ou persiste Garder hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, communiquer immédiateme ou avec un centre antipoison. Mode d'emploi • enlever les verres de contact avant l'utilisat bouchon pour l'enlever • rincer la zone too besoins • ajuster le débit d'écoulement de augmentant ou enfeduisant la pression com ouclaire d'urgence ou une douche	lorée . médiatement des sé dans ou près des soucher la pointe du éutiliser. Une fois est brouillée a proximité, n médecin votre vision change nent avec un médecir on • dévisser le cichée selon les la solution en ercée sur le contenan solution de rinçage ium, phosphate ie de sodium

Aypanal **Principal Display Panel**




Neomycin Principal Display Panel



796041-25 Rev A Unit Carton Printing Plate for "C" size carton.

Principal Display Panel



7001083 Rev B	səttələwoT oitqəsitnA
	Drug Facts
	Active Ingredient Purpose Benzalkonium chloride 0.133% w/v
	Uses antiseptic cleaning of face, hands and body without soap and water. air dries in seconds
	Warnings For external use only
	When using this product • do not use in the eyes or apply over large areas of the body
	Ask a doctor before use • in case of deep or puncture wounds, animal bites, or serious burns
	Stop use and consult a doctor if • irritation, mdness or other symptoms develop • condition persists or gets worse
	Do not use
	Keep out of reach of children. If swallowed, get medical help or contact a Poison Control Center right away.
	Directions • tear open packet, unfold and use as washcloth
	Other Information • store at most two stores 15° - 30° C/50° - 86° F) • do not reuse togelette
	 store at room temperature 15° -30° C(59° -86° F) do not reuse towelette
	Inactive ingredient water

4263 Kit Label SF00000637



4263 Kit Contnets SF00000637

1 NEOMYCIN ANTIBIOTIC 10 PER

1 GAUZE BANDAGE, 4" X 6 YD

1 TWEEZER PLASTICS 4"

1 ABD COMBINE PAD 5" X 9"

1 CPR FILTERSHIELD 77-100

1 1 OZ, BUFF EYEWASH

1 SCISSOR BDGE 4" RED PLS HDL

LBL STOCK 6-3/8"X4"

LBL STOCK 4"X2-7/8"

1 LBL STOCK 3"x1-7/8"

10 BZK ANTISEPTIC WIPE, BULK

2 PR LRG NITRILE GLVES ZIP BAG

1 TAPE ADHESIVE 1/2 X 2.5 125133 1 KIT, PP 16 UNIT FA 1 LABL INSTR FA REV A 1 TRI BNDG NON WOVEN 40"X40"X56" 1 COLD PACK UNIT 4"X6" BULK 2 EYE PADS STD OVAL STERILE 5 GAUZE PADS 4"X4" 12PLY 20 PLASTIC BANDAGE 3/4" X 3" 20 PLASTIC BANDAGE 1" X 3"

5 AYPANAL BULK 2/PK

4263	FIRST					
	rst aid kit ki					
1203 11						
Produ	uct Inform	nation				
Produ	ct Type	HUMAN	OTC DRUG	ltem Co	de (Source)	NDC:0498-4263
Tiouu	et type					
Packa	aging					
# Ite	m Code	Pac	kage Description	n	Marketing Start Date	Marketing End Date
1 NDC: 01	0498-4263-	1 in 1 KIT; Ty Product	pe 0: Not a Combinat	tion	10/18/2018	
Quant	tity of Pa	rts				
Part #		Package C)uantity		Total Product (Quantity
Part 1	1 BOTTLE			30 mL		
Part 2	5 PACKET			10		
Part 3	10 PACKET			9 g		
Part 4	10 PACKET			14 mL		
Part	1 of 4					
EYES		EMERGE	NCY EYEWA	SH		
	d water liqu					
Produ	uct Inform	nation				
ltem C	ode (Sourc	ce)	NDC:0498-0100			
Route	of Adminis	tration	OPHTHALMIC			

Active Ingredie	ent/Active	Moiety				
	Ingredien	-	Basis of	Strength	Str	ength
WATER (UNII: 059QF	-		WATER	Strength	98.6 mL i	-
Inactive Ingree	dients					
		Ingredient Name				Strength
SODIUM CHLORIDE						
		UNII: GR686LBA74) SIC, MONOHYDRATE (UNII: 593`				
SODIUM FIIOSFIIA	IL, MONOBA					
Packaging						
# Item Code	Ра	ckage Description		ting Start Date		ting End ate
	30 mL in 1 BO Product	TTLE; Type 0: Not a Combination				
Marketing I	nformat	ion				
Marketing Category	Applica	tion Number or Monograph Citation	n Marko	eting Start Date		eting End Date
OTC Monograph Dru	g M018		12/18/20	18		
Part 2 of 4						
AYPANAL N acetaminophen t		RIN				
Product Inform	mation					
Item Code (Sour	ce)	NDC:0498-2001				
Route of Adminis	stration	ORAL				
	ent/Active	-				
Active Ingredie		edient Name		Basis of S	-	-
_	-			ACETAMINOPH	IEN	325 mg
	-	_9D) (ACETAMINOPHEN - UNII:3620	D9ITL9D)	ACETAMINOT		525 mg
Active Ingredie ACETAMINOPHEN (Inactive Ingree	(UNII: 36209ITI		D9ITL9D)			525 mg

	(UNII: 4ELV7Z	65AP)					
POVIDONE (UN	III: FZ989GH94	E)					
ODIUM STAR	CH GLYCOLA	TE TYPE A CORN	(UNII: AG9B65PV6B)				
Product Ch	aracterist	ics					
Color		white	Score			2 piece	S
Shape		ROUND	Size			10mm	
Flavor			Imprint Code			circle;U	
Contains							
Packaging							
" Item	Pa	ackage Descri	ption		ing Start	Mark	eting End
Code		T; Type 0: Not a C	-	D	ate		Date
•	Product						
Marketin	-			Mari	leatin a Chant	Ma	destine Food
Marketin Category		Citat	er or Monograph ion	Mar	keting Start Date	ма	rketing End Date
unapproved dru	-						
	g			04/10/	2012		
Part 3 of	4			04/10/	2012		
Part 3 of NEOMYC	4 IN			04/10/	2012		
Part 3 of NEOMYC	4 IN			04/10/	2012		
Part 3 of NEOMYC	4 IN tment			04/10/	2012		
Part 3 of NEOMYC antibiotic oint Product Inf	4 IN tment formation	NDC:0498-0	730	04/10/	2012		
Part 3 of NEOMYC antibiotic oin Product Inf Item Code (S	4 IN tment formation fource)	NDC:0498-0	730	04/10/	2012		
Part 3 of NEOMYC antibiotic oin Product Inf Item Code (S	4 IN tment formation fource)	NDC:0498-0	730	04/10/	2012		
Part 3 of NEOMYC antibiotic oin Product Inf Item Code (S Route of Adm	4 IN tment formation fource) ninistration	NDC:0498-0 TOPICAL	730	04/10/	2012		
Part 3 of NEOMYC antibiotic oint Product Inf Item Code (S Route of Adm Active Ingre	4 IN tment formation fource) ninistration edient/Act	NDC:0498-0 TOPICAL	Ie		Basis of Str	-	_
Part 3 of NEOMYC antibiotic oint Product Inf Item Code (S Route of Adm Active Ingre	4 IN tment formation fource) ninistration edient/Act	NDC:0498-0 TOPICAL				-	Strength 3.5 mg in 1 g
Part 3 of NEOMYC antibiotic oin Product Inf Item Code (S Route of Adm Active Ingra	4 IN tment formation ource) ninistration edient/Act Ir LFATE (UNII: (NDC:0498-0 TOPICAL	Ie		Basis of Str	-	_
Part 3 of NEOMYC antibiotic oin Product Inf Item Code (S Route of Adm Active Ingra	4 IN tment formation ource) ninistration edient/Act Ir LFATE (UNII: (NDC:0498-0 TOPICAL	I e MYCIN - UNII:I16QD7;		Basis of Str	FATE	_
Part 3 of NEOMYC antibiotic oint Product Inf Item Code (S Route of Adm Active Ingre	4 IN tment formation source) ninistration edient/Act Ir LFATE (UNII: (gredients	NDC:0498-0 TOPICAL	I e MYCIN - UNII:I16QD7;		Basis of Str	FATE	3.5 mg in 1 g
Part 3 of NEOMYC antibiotic oin Product Inf Item Code (S Route of Adm Active Ingra NEOMYCIN SU	4 IN tment formation source) ninistration edient/Act Ir LFATE (UNII: (gredients	NDC:0498-0 TOPICAL	I e MYCIN - UNII:I16QD7;		Basis of Str	FATE	3.5 mg in 1

Packaging							
# Item Code	Ра	ckage Description		ng Start Ite	Mark	eting End Date	
).9 g in 1 PAC Product	KET; Type 0: Not a Combination		-			
Marketing I	nformat	ion					
Marketing Category	Applicat	tion Number or Monograph Citation		ting Start Date	Marketing En Date		
unapproved drug other				0			
Part 4 of 4							
ANTISEPTIC	-	ETTE					
benzalkonium ch	loride liquid						
Product Inforn	nation						
ltem Code (Sourc	e)	NDC:0498-0501					
Route of Adminis	tration	TOPICAL					
Active Ingredie	nt/Active	Moiety					
	-	dient Name		asis of Str	•	Strength	
BENZALKONIUM CH JNII:7N6JUD5X6Y)	ILORIDE (UNII	: F5UM2KM3W7) (BENZALKONIUM -		ENZ ALKONIUM ILORIDE	l	1.3 mg in 1 mL	
Inactive Ingred	lients						
	Ing	redient Name			Streng	yth	
WATER (UNII: 059QF	0KO0R)						
Packaging			Maria	ne Chart	N 4		
# Item Code	Pa	ckage Description		ing Start ate	Mark	eting End Date	
	L.4 mL in 1 PA Product	CKET; Type 0: Not a Combination					
Marketing I	nformat	ion					
Marketing Category		tion Number or Monograph Citation		ting Start Date	Mar	keting End Date	
unapproved drug			12/21/201	7			
other							

Marketing Information					
Marketing Category	Application Number or Monograph Citation	Marketing Start Date	Marketing End Date		
unapproved drug other		10/18/2018			

Labeler - Honeywell Safety Products USA, INC (118768815)

Revised: 1/2024

Honeywell Safety Products USA, INC