

**SHEER BROAD SPECTRUM SPF45- zinc oxide, octocrylene, octinoxate, octisalate lotion**  
**Vivier Pharma Inc.**

---

**Sheer Broad Spectrum SPF45**

**DRUG FACTS**

**ACTIVE INGREDIENTS**

9.9% Zinc Oxide  
8.0% Octocrylene  
7.5% Ethylhexyl Methoxycinnamate  
5.0% Ethylhexyl Salicylate

**PURPOSE**

Sunscreen

**USES**

- Helps prevent sunburn and provides a sun protection factor of 45.
- Ideal for daily use; can be applied under makeup.

**For external use only**

- The sun may cause sunburn, premature aging of the skin and skin cancer. Avoiding the sun, wearing protective clothing and regular use of sunscreens over the years may reduce the chance of these harmful effects.

**When using this product**

- Avoid contact with eyes. If contact occurs, rinse thoroughly with water.
- Do not use on damaged or broken skin.

**Stop use and ask a doctor if**

- Rash or irritation develops and lasts.

**Keep out of reach of children.**

If swallowed, get medical help or contact a Poison Control Center right away.

**DIRECTIONS**

- Apply daily to face, neck and chest.
- Apply liberally and evenly 15 minutes before sun exposure.
- Reapply at least every 2 hours or as needed after towel drying, perspiring heavily or

washing.

- For use on children less than 6 months of age, consult a healthcare practitioner.
- Use a water resistant sunscreen if swimming or sweating.

Store at room temperature (15-30°C / 59-86°F).

## **INACTIVE INGREDIENTS**

BEHENYL ALCOHOL, BUTYLPARABEN, BUTYROSPERMUM PARKII, C12-15 ALKYL BENZOATE, CETEARETH-20, CETEARYL ALCOHOL, CYCLOPENTASILOXANE, CYCLOTETRASILOXANE, ETHYLPARABEN, METHYLPARABEN, PHENOXYETHANOL, PHENYL TRIMETHICONE, PROPYLPARABEN, SILICA, TETRASODIUM EDTA, TOCOPHERYL ACETATE, TRIETHOXYCAPRYLYLSILANE, WATER/EAU.

## **Questions?**

450 455 9779                    1 877 484 8437

## **Product Labels**

NDC 67226-2845-9



## SHEER

BROAD SPECTRUM SPF 45  
WITH TRANSPARENT  
ZINC OXIDE

À LARGE SPECTRE FPS 45  
AVEC OXYDE DE ZINC  
TRANSPARENT

ALL SKIN TYPES  
TOUS TYPES DE PEAU

LOTION

DIN 0243775

90 mL / 3 fl oz

### INDICATION

Helps prevent sunburn and provides a sun protection factor of 45. Ideal for daily use; can be applied under makeup.

### DIRECTIONS

Apply daily to face, neck and chest. Apply liberally and evenly 15 minutes prior to sun exposure. Reapply at least every 2 hours or as needed after towel drying, perspiring heavily or washing. Use a water resistant sunscreen if swimming or sweating. For use on children less than 6 months of age, consult a healthcare practitioner.

### PRECAUTIONS

For external use only. Do not use on damaged or broken skin. If rash occurs, discontinue use and consult a health care practitioner. When using this product keep out of eyes. Rinse with water to remove. Keep out of reach of children. If swallowed, get medical help or contact a Poison Control Center right away. The sun may cause sunburn, premature aging of the skin and skin cancer. Avoiding the sun, wearing protective clothing and regular use of sunscreens over the years may reduce the chance of these harmful effects. Oil-free. Fragrance-free.

### INDICATION

Aident à prévenir les coups de soleil et offre un facteur de protection solaire de 45. Idéal pour utilisation quotidienne; peut être utilisé sous le maquillage.

### MODE D'EMPLOI

Appliquer quotidiennement au visage, cou et décolleté. Appliquer abondamment et uniformément 15 minutes avant une exposition au soleil. Appliquer de nouveau au moins toutes les 2 heures ou au besoin après la baignade, le séchage à la serviette, après avoir transpiré abondamment ou après le bain. Utiliser un écran solaire résistant à l'eau lors d'une activité aquatique ou s'il y a transpiration. Consulter un médecin avant d'utiliser sur un enfant de moins de 6 mois.

### PRÉCAUTIONS

Pour usage externe seulement. Ne pas utiliser sur la peau endommagée ou présentant des lésions. En présence d'une éruption cutanée, cesser l'utilisation et consulter un professionnel de la santé. Éviter tout contact avec les yeux. Rincer à l'eau le cas échéant. Garder hors de portée des enfants. En cas d'ingestion, consulter un médecin immédiatement ou appeler un centre antipoison. Le soleil peut causer des coups de soleil, un vieillissement prématuro de la peau et le cancer de la peau. Le fait d'éviter l'exposition au soleil, le port de vêtements protecteurs et l'usage régulier d'écrans solaires peut, avec les années, réduire le risque de ces effets nocifs. Sans huile. Sans parfum.

### ACTIVE INGREDIENTS (w/w) / INGRÉDIENTS ACTIFS (p/p)

- 9.9% Zinc Oxide
- 8.0% Octocrylene
- 7.5% Ethylhexyl Methoxycinnamate
- 5.0% Ethylhexyl Salicylate

Vivier Canada Inc.  
Mfd. for Vivier Pharma  
Hudson QC Canada J0P 1H0  
Champlain NY 12919  
Made in Canada  
vivierpharma.com

® Vivier Canada Inc. – used under license

01-8925-01D10

**DRUG FACTS CONTINUED**

**INACTIVE INGREDIENTS / INGRÉDIENTS INACTIFS:** BEHENYL ALCOHOL, BUTYLPARABEN, BUTYROSPERMUM PARKII, C12-15 ALKYL BENZOATE, CETEARETH-20, CETEARYL ALCOHOL, CYCLOPENTASILOXANE, CYCLOTETRASILOXANE, ETHYLPARABEN, METHYLPARABEN, PHENOXYETHANOL, PHENYL TRIMETHICONE, PROPYLPARABEN, SILICA, TETRASODIUM EDTA, TOCOPHERYL ACETATE, TRIETHOXCAPRYLYLSILANE, WATER/EAU.

**Questions?**  
450 455 9779 1 877 484 8437

**DRUG FACTS**

ACTIVE INGREDIENTS	PURPOSE
• 9.9% Zinc Oxide	Sunscreen
• 8.0% Octocrylene	Sunscreen
• 7.5% Ethylhexyl Methoxycinnamate	Sunscreen
• 5.0% Ethylhexyl Salicylate	Sunscreen

**USES**

- Helps prevent sunburn and provides a sun protection factor of 45.
- Ideal for daily use; can be applied under makeup.

**WARNINGS****For external use only**

- The sun may cause sunburn, premature aging of the skin and skin cancer. Avoiding the sun, wearing protective clothing and regular use of sunscreens over the years may reduce the chance of these harmful effects.

**When using this product**

- Avoid contact with eyes. If contact occurs, rinse thoroughly with water.
- Do not use on damaged or broken skin.

**Stop use and ask a doctor if**

- Rash or irritation develops and lasts.

**Keep out of reach of children**

If swallowed, get medical help or contact a Poison Control Center right away.

**DIRECTIONS**

- Apply daily to face, neck and chest.
- Apply liberally and evenly 15 minutes before sun exposure.
- Reapply at least every 2 hours or as needed after towel drying, perspiring heavily or washing.
- For use on children less than 6 months of age, consult a healthcare practitioner.
- Use a water resistant sunscreen if swimming or sweating.

Store at room temperature  
(15-30 °C / 59-86 °F).

Oil free. Fragrance-free.

**SHEER**

BROAD SPECTRUM SPF 45  
WITH TRANSPARENT  
ZINC OXIDE

À LARGE SPECTRE FPS 45  
AVEC OXYDE DE ZINC  
TRANSPARENT

ALL SKIN TYPES  
TOUS TYPES DE PEAU

**LOTION**

90 mL  
3 fl oz

DIN 0243775



Vivier Canada Inc.  
Mfd. for Vivier Pharma  
Hudson QC Canada J0P 1H0  
Champlain NY USA 12919  
Made in Canada  
vivierpharma.com

© Vivier Canada Inc. – used under license  
07-8925-01011

**INFORMATIONS PHARMACEUTIQUES****INGRÉDIENTS ACTIFS ..... OBJECTIF**

• 9.9 % Zinc Oxide	Écran solaire
• 8.0 % Octocrylene	Écran solaire
• 7.5 % Ethylhexyl Methoxycinnamate	Écran solaire
• 5.0 % Ethylhexyl Salicylate	Écran solaire

**INDICATIONS**

- Aident à prévenir les coups de soleil et offre un facteur de protection solaire de 45.
- Idéal pour utilisation quotidienne; peut être utilisé sous le maquillage.

**PRÉCAUTIONS****Pour usage externe seulement**

- Le soleil peut causer des coups de soleil, un vieillissement prématué de la peau et le cancer de la peau. Le fait d'éviter l'exposition au soleil, le port de vêtements protecteurs et l'usage régulier d'écrans solaires peut, avec les années, réduire le risque de ces effets nocifs.

**Durant l'application de ce produit**

- Éviter tout contact avec les yeux. En cas de contact, bien vous les rincer avec de l'eau.
- Ne pas utiliser sur la peau endommagée ou présentant des lésions.

**Cessez l'utilisation et demandez l'avis d'un médecin si**

- Irritations ou éruptions apparaissent.

**Garder hors de portée des enfants.**

En cas d'ingestion, obtenez des soins médicaux ouappelez immédiatement un Centre anti-poison.

**MODE D'EMPLOI**

- Appliquer quotidiennement au visage, cou et décolleté.
- Appliquer abondamment et uniformément 15 minutes avant l'exposition au soleil.
- Appliquer de nouveau au moins toutes les 2 heures ou au besoin après la baignade, le séchage à la serviette, après avoir transpiré abondamment ou après le bain.
- Consulter un médecin avant d'utiliser sur un enfant de moins de 6 mois.
- Utiliser un écran solaire résistant à l'eau lors d'une activité aquatique ou s'il y a transpiration.

**Questions ?**

450 455 9779 1 877 484 8437

Conserver à température ambiante  
(15-30 °C / 59-86 °F).

Sans huile. Sans parfum.

**250mL Packaging**

DIN 02437775 | NDC 67226-2845-2



## SHEER

BROAD SPECTRUM SPF 45 LOTION  
WITH TRANSPARENT  
ZINC OXIDE

LOTION À LARGE SPECTRE FPS 45  
AVEC OXYDE DE ZINC  
TRANSPARENT

PROFESSIONAL USE ONLY  
USAGE PROFESSIONNEL SEULEMENT

250 ml | 8.45 fl oz

### Drug facts

Active ingredients	Purpose
Zinc Oxide 9.9%	
Octocrylene 8.0%	
Ethylhexyl Methoxycinnamate 7.5%	
Ethylhexyl Salicylate 5.0%	
	Sunscreen

**Uses** • Helps prevent sunburn and provides a sun protection factor of 45.  
• Ideal for daily use; can be applied under makeup.

### Warnings

**For external use only.** The sun may cause sunburn, premature aging of the skin and skin cancer. Avoiding the sun, wearing protective clothing and regular use of sunscreens over the years may reduce the chance of these harmful effects. **When using this product** • Avoid contact with eyes. If contact occurs, rinse thoroughly with water. • Do not use on damaged or broken skin. **Stop use and ask a doctor if** rash or irritation develops and lasts. **Keep out of reach of children.** If swallowed, get medical help or contact a Poison Control Center right away.

**Directions** • Apply daily to face, neck and chest. • Apply liberally and evenly 15 minutes before sun exposure.  
• Reapply at least every 2 hours or as needed after towel drying, perspiring heavily or washing. • For use on children less than 6 months of age, consult a healthcare practitioner. • Use a water resistant sunscreen if swimming or sweating.

### Other information

Store at room temperature (15-30°C / 59-86°F).

### Inactive ingredients

Behenyl Alcohol, Butylparaben, Butyrospermum Parkii (Shea Butter), C12-15 Alkyl Benzoate, Ceteareth-20, Cetearyl Alcohol, Cyclohexasiloxane, Cyclopentasiloxane, Ethylparaben, Methylparaben, Phenoxyethanol, Phenyl Trimethicone, Propylparaben, Silica, Tetrasodium EDTA, Tocopherol, Triethoxycaprylylsilane, Water.

**Questions?** Call 1 877 484 8437

Oil-free  
Fragrance-free  
Recommended by physicians

THE BEAUTY OF RESULTS™



Vivier Canada Inc. | Mfd. for Vivier Pharma  
Vaudreuil-Dorion QC Canada J7V 5V5  
Champlain NY USA 12919  
vivierskin.com

Made in Canada

© / TM Vivier Canada Inc. – used under license 01-8925P-05



### Informations pharmaceutiques

Ingédients actifs	Utilité
Oxyde de Zinc 9.9%	
Octocrylene 8.0 %	
Ethylhexyl Methoxycinnamate 7.5 %	
Ethylhexyl Salicylate 5.0 %	
	Ecran solaire

**Usages** • Aide à prévenir les coups de soleil et offre un facteur de protection solaire de 45. • Idéal pour utilisation quotidienne; peut être utilisé sous le maquillage.

### Mises en garde

**Pour usage externe seulement.** Le soleil peut causer des coups de soleil, un vieillissement prématûre de la peau et le cancer de la peau. Le fait d'éviter l'exposition au soleil, le port de vêtements protecteurs et l'usage régulier d'écrans solaires peut, avec les années, réduire le risque de ces effets nocifs. **Lorsque vous utilisez ce produit** • Éviter tout contact avec les yeux. En cas de contact, bien vous les rincer avec de l'eau. • Ne pas utiliser sur la peau endommagée ou présentant des lésions. **Cesser l'utilisation et demander l'avis d'un médecin si** irritations ou éruptions apparaissent. **Garder hors de portée des enfants.** En cas d'ingestion, obtenir des soins médicaux ou appeler immédiatement un Centre anti-poison.

**Mode d'emploi** • Appliquer quotidiennement au visage, cou et décolleté. • Appliquer abondamment et uniformément 15 minutes avant l'exposition au soleil. • Appliquer de nouveau au moins toutes les 2 heures ou au besoin après la baignade, le séchage à la serviette, après avoir transpiré abondamment ou après le bain. • Consulter un médecin avant d'utiliser sur un enfant de moins de 6 mois. • Utiliser un écran solaire résistant à l'eau lors d'une activité aquatique ou s'il y a transpiration.

### Autre renseignement

Conserver à la température ambiante (15-30 °C / 59-86 °F)

### Ingédients inactifs

Behenyl Alcohol, Butylparaben, Butyrospermum Parkii (Shea Butter), C12-15 Alkyl Benzoate, Ceteareth-20, Cetearyl Alcohol, Cyclohexasiloxane, Cyclopentasiloxane, Ethylparaben, Methylparaben, Phenoxyethanol, Phenyl Trimethicone, Propylparaben, Silica, Tetrasodium EDTA, Tocopherol, Triethoxycaprylylsilane, Eau.

**Questions ?** Composez le 1 877 484 8437

Sans huile  
Sans parfum  
Recommandé par les médecins

LA BEAUTÉ DES RÉSULTATS™



6 96163 89125 0

## SHEER BROAD SPECTRUM SPF45

zinc oxide, octocrylene, octinoxate, octisalate lotion

### Product Information

Product Type

HUMAN OTC DRUG

Item Code (Source)

NDC:67226-2845

**Active Ingredient/Active Moiety**

Ingredient Name	Basis of Strength	Strength
<b>ZINC OXIDE</b> (UNII: SOI2LOH54Z) (ZINC CATION - UNII:13S1S8SF37)	ZINC CATION	99 mg in 1 mL
<b>OCTOCRYLENE</b> (UNII: 5A68WGF6WM) (OCTOCRYLENE - UNII:5A68WGF6WM)	OCTOCRYLENE	80 mg in 1 mL
<b>OCTINOXATE</b> (UNII: 4Y5P7MUD51) (OCTINOXATE - UNII:4Y5P7MUD51)	OCTINOXATE	75 mg in 1 mL
<b>OCTISALATE</b> (UNII: 4X49Y0596W) (OCTISALATE - UNII:4X49Y0596W)	OCTISALATE	50 mg in 1 mL

**Inactive Ingredients**

Ingredient Name	Strength
<b>POLYOXYL 20 CETOSTEARYL ETHER</b> (UNII: YRC528SWUY)	
<b>CETOSTEARYL ALCOHOL</b> (UNII: 2DMT128M1S)	
<b>CYCLOMETHICONE 5</b> (UNII: 0HT5PCI0R)	
<b>CYCLOMETHICONE 4</b> (UNII: CZ227117JE)	
<b>ETHYLPARABEN</b> (UNII: 14255EXE39)	
<b>METHYLPARABEN</b> (UNII: A2I8C7HI9T)	
<b>PHENOXYETHANOL</b> (UNII: HIE492ZZ3T)	
<b>PHENYL TRIMETHICONE</b> (UNII: DR0K5NOJ4R)	
<b>DOCOSANOL</b> (UNII: 9G1OE216XY)	
<b>BUTYLPARABEN</b> (UNII: 3QPI1U3FV8)	
<b>ALKYL (C12-15) BENZOATE</b> (UNII: A9EJ3J61HQ)	
<b>PROPYLPARABEN</b> (UNII: Z8IX2SC1OH)	
<b>SILICON DIOXIDE</b> (UNII: ETJ7Z6XBU4)	
<b>EDETADE SODIUM</b> (UNII: MP1J8420LU)	
<b>.ALPHA.-TOCOPHEROL ACETATE</b> (UNII: 9E8X80D2L0)	
<b>TRIETHOXYCAPRYLYLSILANE</b> (UNII: LDC331P08E)	
<b>WATER</b> (UNII: 059QF0KO0R)	

**Packaging**

#	Item Code	Package Description	Marketing Start Date	Marketing End Date
1	NDC:67226-2845-9	1 in 1 CARTON	05/14/2015	09/30/2026
1		90 mL in 1 BOTTLE; Type 0: Not a Combination Product		
2	NDC:67226-2845-2	250 mL in 1 TUBE; Type 0: Not a Combination Product	05/14/2015	
3	NDC:67226-2845-4	1 in 1 CARTON	05/14/2015	06/01/2017
3		4 mL in 1 TUBE; Type 0: Not a Combination Product		

**Marketing Information**

Marketing Category	Application Number or Monograph Citation	Marketing Start Date	Marketing End Date

**Labeler** - Vivier Pharma Inc. (250996550)

Revised: 10/2023

Vivier Pharma Inc.