

MAXIBAN 72- narasin and nicarbazin powder
Elanco US Inc.

Elanco™

AF1372

Maxiban™ 72

(narasin and nicarbazin Type A medicated article)

For Use In Broiler Chicken Feeds Only

Do not feed undiluted.

Active Drug Ingredients:

narasin	36 g per lb
nicarbazin	36 g per lb

For the prevention of coccidiosis in broiler chickens caused by *Eimeria necatrix*, *E. tenella*, *E. acervulina*, *E. brunetti*, *E. mivati*, and *E. maxima*.

Important: Must be thoroughly mixed into feeds before use.

Mixing Directions: (Broiler Chickens): Thoroughly mix the following amounts of Maxiban 72 in one ton of complete feed to provide from 27 to 45 grams per ton each of narasin and nicarbazin. The dosage should be adjusted to meet the severity of the coccidial challenge, which varies with environmental and management conditions. A preblend of the Maxiban 72 in 15-20 lbs of feed should be made before incorporating into the total amount of finished feed.

Narasin and Nicarbazin (Grams Per Ton)	Maxiban 72 (Pounds Per Ton of Type C Medicated Feed)
27 Narasin and 27 Nicarbazin	0.75
36 Narasin and 36 Nicarbazin	1.00
45 Narasin and 45 Nicarbazin	1.25

Example of Type B medicated feed – Amounts of Type A medicated article necessary to manufacture one ton of Type B medicated feed. The maximum permitted Type B medicated feed concentration is 11,350 g/ton each of narasin and nicarbazin.

Pounds of Maxiban 72 to Add Per Ton to Make a Type B Medicated Feed	Resulting Narasin and Nicarbazin Concentration in the Type B Medicated Feed	
	g/ton (for each drug)	g/lb (for each drug)
27.56	992.2	0.50
55.12	1,984.3	0.99

110.24	3,968.6	1.98
--------	---------	------

Feeding Directions:

Feed continuously as the sole ration.

Caution: Nicarbazin medicated broilers may show reduced heat tolerance if exposed to high temperature and high humidity. Provide adequate drinking water and ventilation during these periods. Do not allow adult turkeys, horses or other equines access to formulations containing narasin. Ingestion of narasin by these species has been fatal. Do not feed to laying hens.

Warning

Withdrawal Period: No withdrawal period is required.

User Safety Warning: When mixing and handling Maxiban 72, use protective clothing, impervious gloves, and a dust mask. Operators should wash thoroughly with soap and water after handling. If accidental eye contact occurs, immediately rinse thoroughly with water. Not for human use.

Adverse Drug Reactions:

To report adverse effects, access medical information, or obtain additional product information, call 1-800-428-4441.

Store at or below 25°C (77°F). Excursions permitted to 37°C (99°F).

Not to be used after the date printed on bag.

Restricted Drug (California) - Use Only as Directed

NADA # 138-952, Approved by FDA

Elanco US Inc.

Greenfield, IN 46140, USA

Maxiban, Elanco and the diagonal bar logo are trademarks of Elanco or its affiliates.

TAKE TIME

OBSERVE LABEL DIRECTIONS

Net Weight 25 kg (55.12 lb)

BG100754X

Elanco™

AF1372

Maxiban™ 72

(narasina y nicarbanzina artículo medicado Tipo A)

Sólo para uso en alimento de Pollos de Engorde

No administrar sin diluir

Principios Activos: narasina - 36 g per lb (80 g per kg)

nicarbazina - 36 g per lb (80 g per kg)

Para la prevención de coccidiosis en pollos de engorde causada por *Eimeria necatrix*, *E. tenella*, *E. acervulina*, *E. brunetti*, *E. mivati* y *E. maxima*.

Importante: Debe mezclarse bien con el alimento antes de usarse.

Instrucciones para la mezcla: (Pollos de engorde): Mézclese completamente las siguientes cantidades de Maxiban 72 en una tonelada de alimento completo para proporcionar de 27 a 45 g/tonelada corta (30 a 50 g/Ton Métrica), tanto de narasina como de nicarbazina. La dosis debe ajustarse de acuerdo con la gravedad del desafío por coccidias, el cual varía según las condiciones ambientales y de manejo.

Se debe realizar una premezcla de Maxiban 72 en 15-20 lb de alimento antes de incorporar al total de alimento terminado.

Narasina + Nicarbazina (Gramos por Tonelada)	Maxiban 72 (Libras por tonelada en el alimento medicado tipo C)
27 Narasina and 27 Nicarbazina	0.75
36 Narasina and 36 Nicarbazina	1.00
45 Narasina and 45 Nicarbazina	1.25

Ejemplo de alimento medicado tipo B: Cantidad de artículo medicado tipo A necesaria para fabricar una tonelada de alimento medicado tipo B. La concentración máxima permitida para el alimento medicado tipo B es de 11,350 g/ton cada una de narasina y nicarbazina.

Libras de Maxiban 72 a añadir por tonelada para preparar alimento medicado de tipo B	Concentración resultante de narasina y nicarbazina en el alimento medicado tipo B	
	g/ton (para cada medicamento)	g/lb (para cada medicamento)
27.56	992.2	0.50
55.12	1,984.3	0.99
110.24	3,968.6	1.98

Instrucciones de uso: Administre continuamente como ración única.

Precaución: Los pollos tratados con nicarbazina pueden presentar menor tolerancia al calor si son expuestos a temperaturas y humedad elevadas. Proveer agua de bebida y ventilación adecuadas durante estos períodos. No permita que pavos adultos, caballos u otros equinos tengan acceso a raciones que contengan narasina ya que la ingestión de narasina por parte de estas especies es fatal. No administrar a gallinas de postura.

Advertencia:

Período de retiro: no se requiere ningún período de retiro.

Advertencia de seguridad para el usuario: Deberá usarse ropa protectora, guantes impermeables y mascarilla antipolvo al mezclar o manipular el producto. Los operadores deberán lavarse cuidadosamente con agua y jabón después de manejar el producto.

Si se produce contacto accidental con los ojos, lavar inmediatamente con agua abundante. No usar en seres humanos.

Reacciones adversas al fármaco: Para reportar efectos adversos, obtener información medica o información adicional del producto, llame al 1-800-428-4441.

Conservar a una temperatura igual o menor a 25 °C (77 °F).

Se permiten variaciones hasta 37 °C (99 °F).

No se deberá usar después de la fecha impresa envase.

Medicamento Restringido (California) - úsese Sólo Como se Indica.

NADA# 138-952, Aprobado por FDA.

Elanco US Inc.

Greenfield, IN 46140, Estados Unidos de América

Maxiban, Elanco y el logo de la barra diagonal son marcas de Elanco o sus afiliadas.

TAKE TIME

OBSERVE LABEL DIRECTIONS

Peso neto: **25 kg** (55.12 lb)

BG100754X

Principal Display Panel - 22.68 Bag Label

Elanco™

AF1372

Maxiban™ 72

(narsin and nicarbazin Type A medicated article)

For Use In Broiler Chicken Feeds Only

Do Not Feed Undiluted



Elanco™

AF1372

Maxiban™ 72

TM

(narsin and nicarbazin
Type A medicated article)

For Use In Broiler Chicken Feeds Only

Do not feed undiluted.

Active Drug Ingredients: narsin 36 g per lb
nicarbazin 36 g per lb

For the prevention of coccidiosis in broiler chickens caused by *Eimeria necatrix*, *E. tenella*, *E. acervulina*, *E. brunetti*, *E. mivati*, and *E. maxima*.

Important: Must be thoroughly mixed into feeds before use.

Mixing Directions: (Broiler Chickens): Thoroughly mix the following amounts of Maxiban 72 in one ton of complete feed to provide from 27 to 45 grams per ton each of narsin and nicarbazin. The dosage should be adjusted to meet the severity of the coccidial challenge, which varies with environmental and management conditions. A preblend of the Maxiban 72 in 15-20 lbs of feed should be made before incorporating into the total amount of finished feed.

Narsin and Nicarbazin (Grams Per Ton)	Maxiban 72 (Pounds Per Ton of Type C Medicated Feed)
27 Narsin and 27 Nicarbazin	0.75
36 Narsin and 36 Nicarbazin	1.00
45 Narsin and 45 Nicarbazin	1.25

Example of Type B medicated feed - Amounts of Type A medicated article necessary to manufacture one ton of Type B medicated feed. The maximum permitted Type B medicated feed concentration is 11,350 g/ton each of narsin and nicarbazin.

Pounds of Maxiban 72 to Add Per Ton to Make a Type B Medicated Feed	Resulting Narsin and Nicarbazin Concentration in the Type B Medicated Feed	
	g/ton (for each drug)	g/lb (for each drug)
27.56	992.2	0.50
55.12	1,984.3	0.99
110.24	3,968.6	1.98

Feeding Directions: Feed continuously as the sole ration.

Caution: Nicarbazin medicated broilers may show reduced heat tolerance if exposed to high temperature and high humidity. Provide adequate drinking water and ventilation during these periods. Do not allow adult turkeys, horses or other equines access to formulations containing narsin. Ingestion of narsin by these species has been fatal. Do not feed to laying hens.

Warning

Withdrawal Period: No withdrawal period is required.

User Safety Warning: When mixing and handling Maxiban 72, use protective clothing, impervious gloves, and a dust mask. Operators should wash thoroughly with soap and water after handling. If accidental eye contact occurs, immediately rinse thoroughly with water. Not for human use.

Adverse Drug Reactions: To report adverse effects, access medical information, or obtain additional product information, call 1-800-428-4441.

Store at or below 25°C (77°F). Excursions permitted to 37°C (99°F).

Not to be used after the date printed on bag.

Restricted Drug (California) - Use Only as Directed

NADA # 138-952, Approved by FDA

Elanco US Inc.

Greenfield, IN 46140, USA

Maxiban, Elanco and the diagonal bar logo are trademarks of Elanco or its affiliates.



Net Weight
25 kg
(55.12 lb)

BG100754X

Elanco™

Maxiban™ 72

Elanco™

AF1372

Maxiban™ 72

TM

(narsina y nicarbazina
artículo medicado Tipo A)

Sólo para uso en alimento de Pollos de Engorde

No administrar sin diluir.

Principios Activos: narsina - 36 g per lb (80 g per kg)
nicarbazina - 36 g per lb (80 g per kg)

Para la prevención de coccidiosis en pollos de engorde causada por *Eimeria necatrix*, *E. tenella*, *E. acervulina*, *E. brunetti*, *E. mivati* y *E. maxima*.

Importante: Debe mezclarse bien con el alimento antes de usarse.

Instrucciones para la mezcla (Pollos de engorde): Mezcle completamente las siguientes cantidades de Maxiban 72 en una tonelada de alimento completo para proporcionar de 27 a 45 g/tonelada corta (30 a 50 g/Ton Métrica), tanto de narsina como de nicarbazina. La dosis debe ajustarse de acuerdo con la gravedad del desafío por coccidias, el cual varía según las condiciones ambientales y de manejo.

Se debe realizar una premezcla de Maxiban 72 en 15-20 lb de alimento antes de incorporar al total de alimento terminado.

Narsina + Nicarbazina (Gramos por Tonelada)	Maxiban 72 (Libras por tonelada en alimento medicado Tipo C)
27 Narsina and 27 Nicarbazina	0.75
36 Narsina and 36 Nicarbazina	1.00
45 Narsina and 45 Nicarbazina	1.25

Ejemplo de alimento medicado Tipo B: Cantidad de artículo medicado Tipo A necesaria para fabricar una tonelada de alimento medicado Tipo B. La concentración máxima permitida para el alimento medicado Tipo B es de 11,350 g/ton cada una de narsina y nicarbazina.

Libras de Maxiban 72 a añadir por tonelada para preparar alimento medicado de tipo B	Concentración resultante de narsina y nicarbazina en el alimento medicado tipo B	
	g/ton (para cada medicamento)	g/lb (para cada medicamento)
27.56	992.2	0.50
55.12	1,984.3	0.99
110.24	3,968.6	1.98

Instrucciones de uso: Administre continuamente como ración única.

Precaución: Los pollos tratados con nicarbazina pueden presentar menor tolerancia al calor si son expuestos a temperaturas y humedad elevadas. Proveer agua de bebida y ventilación adecuadas durante estos periodos. No permita que pavos, aditos, caballos u otros equinos tengan acceso a raciones que contengan narsina ya que la ingestión de narsina por parte de estas especies es fatal. No administrar a gallinas de postura.

Advertencia:

Periodo de retiro: no se requiere ningún periodo de retiro.

Advertencia de seguridad para el usuario: Deberá usarse ropa protectora, guantes impermeables y mascarilla antipolvo al mezclar o manipular el producto. Los operadores deberán lavarse cuidadosamente con agua y jabón después de manejar el producto. Si se produce contacto accidental con los ojos, lavar inmediatamente con agua abundante. No usar en seres humanos.

Reacciones adversas al fármaco: Para reportar efectos adversos, obtener información médica o información adicional del producto, llame al 1-800-428-4441.

Conservar a una temperatura igual o menor a 25°C (77°F).

Se permiten variaciones hasta 37°C (99°F).

No se deberá usar después de la fecha impresa envaso.

Medicamento Restringido (California) - Úsese Sólo Como se indica.

NADA# 138-952, Aprobado por FDA.

Elanco US Inc.

Greenfield, IN 46140, Estados Unidos de América

Maxiban, Elanco y el logo de la barra diagonal

son marcas de Elanco o sus afiliadas.



Peso neto: 25 kg
(55.12 lb)

BG100754X

MAXIBAN 72

narsin and nicarbazin powder

Product Information

Product Type

OTC TYPE A MEDICATED ARTICLE ANIMAL
DRUG

Item Code (Source)

NDC:58198-
1372

Route of Administration

ORAL

Active Ingredient/Active Moiety

Ingredient Name		Basis of Strength	Strength	
narasin (UNII: DZY9VU539P) (narasin - UNII:DZY9VU539P)		narasin	36 g in 0.45 kg	
nicarbazin (UNII: 11P9NUA12U) (4,4'-dinitrocarbanilide - UNII:9IDD210E75)		nicarbazin	36 g in 0.45 kg	
Packaging				
#	Item Code	Package Description	Marketing Start Date	Marketing End Date
1	NDC:58198-1372-1	22.68 kg in 1 BAG		
Marketing Information				
Marketing Category		Application Number or Monograph Citation	Marketing Start Date	Marketing End Date
NADA		NADA138952	02/11/2010	

Labeler - Elanco US Inc. (966985624)

Revised: 11/2022

Elanco US Inc.