

**VICKS JARABE COUGH CONGESTION- dextromethorphan hbr and
guaifenesin liquid**
The Procter & Gamble Manufacturing Company

VICKS® Jarabe Cough + Congestion

Drug Facts

Active ingredients (in each 7.5 mL)

Dextromethorphan HBr 5 mg
Guaifenesin 100 mg

Purpose

Cough suppressant
Expectorant

Uses

- temporarily relieves cough due to minor throat and bronchial irritation associated with a cold
- helps loosen phlegm (mucus) and thin bronchial secretions to rid the bronchial passageways of bothersome mucus

Warnings

Do not use

if you are now taking a prescription monoamine oxidase inhibitor (MAOI) (certain drugs for depression, psychiatric or emotional conditions, or Parkinson's disease), or for 2 weeks after stopping the MAOI drug. If you do not know if your prescription drug contains an MAOI, ask a doctor or pharmacist before taking this product.

Ask a doctor before use if you have

- cough that occurs with too much phlegm (mucus)
- persistent or chronic cough such as occurs with smoking, asthma, chronic bronchitis or emphysema
- a sodium-restricted diet

Stop use and ask a doctor if

cough persists for more than 1 week, tends to recur, or is accompanied by fever, rash or persistent headache. A persistent cough may be a sign of a serious condition.

If pregnant or breast-feeding,

ask a health professional before use.

Keep out of reach of children.

In case of overdose, get medical help or contact a Poison Control Center right away.

Directions

- only use the dose cup provided
- do not exceed 6 doses per 24 hrs

adults & children 12 yrs & over	30 mL every 4 hrs
children 6 to under 12 yrs	15 mL every 4 hrs
children 4 to under 6 yrs	7.5 mL every 4 hrs
children under 4 yrs	do not use

Other information

- **each 7.5 mL contains:**sodium 23 mg
- store at no greater than 25°C

Inactive ingredients

citric acid, FD&C Red No. 40, flavors, glycerin, propylene glycol, saccharin sodium, sodium benzoate, sodium chloride, sodium citrate, sorbitol, water, xanthan gum

Questions?

1-800-362-1683

TAMPER EVIDENT: Do not use if printed safety seal under cap is missing or damaged

Made in Canada

DIST. BY: PROCTER & GAMBLE, CINCINNATI, OH 45202

PRINCIPAL DISPLAY PANEL - 236 ml Bottle Label

VICKS®

Jarabe

COUGH + CONGESTION

Dextromethorphan HBr - Cough

Guaifensin - Chest Congestion

COATS & SOOTHES YOUR THROAT

8 FL OZ (236 mL)



Información del medicamento	
Ingredientes activos (por cada 7.5 mL) Dextrometorfano HBr 2 mg Guaifenesina 100 mg	Propósito Efectuante Expectorante
Uso • para aliviar de la tos debido a la irritación leve de las vías respiratorias y la garganta asociada con un resfriado • ayuda a aliviar la ferrea (muco) y reduce las secreciones bronquiales para liberar a los conductos bronquiales de la mucosidad de la mucosidad	
Advertencias No utilice el producto si está tomando un inhibidor de la monoaminoxidasa (MAOI) recetado (varios medicamentos para la depresión, hipertensión pulmonar y enfermedades a enfermedad de Parkinson) por 2 semanas después de suspender el medicamento MAOI. Si no sabe si su medicamento recetado contiene un MAOI, consulte con un médico o farmacéutico antes de tomar este producto. Consulte con un médico antes de utilizar si tiene • los que producen demasiado ferrea (muco) • los que padecen o sufren de asma o bronquitis, con el asma, la bronquitis crónica o el enfisema • una dieta restringida en sodio Evite el uso de alcohol cuando use un medicamento • Si los datos más de una semana, ferre o sople o está acompañado de ferre, sangrado o dolor de cabeza persistente. La tos persistente puede ser un síntoma de una condición más grave. Evite el uso de bebidas y alimentos, consulte con un profesional de la salud antes de utilizar el producto. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de sobredosis, busque ayuda médica o acompañe de inmediato con un Centro de Control de Envenenamiento.	
Indicaciones • Utilice solo la dosis indicada previamente • No exceda la dosis por cada 24 horas Niños de 12 años o más: 30 mL cada 4 horas Niños de 6 a 12 años: 15 mL cada 4 horas Niños de 4 a 6 años: 7.5 mL cada 4 horas Niños menores de 4 años: no utilizar	
Información adicional • cada 7.5 mL contiene sodio 22 mg. • almacenar a una temperatura que no supera los 25°C (77°F)	
Ingredientes inactivos: ácido cítrico, rojo #40 de FD&C, subacetato de glicerilo, propilenglicol, sacarato sódico, lactato de sodio, óxido de sodio, citrato de sodio, sorbitol, goma xantana, agua	
Registros: 1-800-368-3683	
Drug Facts	
Active ingredients (in each 7.5 mL) Dextromethorphan HBr 2 mg Guaifenesin 100mg	Purpose Cough suppressant Expectorant
Uses • temporarily relieves cough due to minor throat and bronchial irritation associated with a cold • helps loosen phlegm (mucus) and thin bronchial secretions to aid the bronchial passageway of bothersome mucus	
Warnings Do not use if you are now taking a prescription monoamine oxidase inhibitor (MAOI) (certain drugs for depression, psychiatric or emotional conditions, or Parkinson's disease), or for 2 weeks after stopping the MAOI drug. If you do not know if your prescription drug contains an MAOI, ask a doctor or pharmacist before taking the product. Ask a doctor before use if you have • cough that occurs with the chest pain (asthma) • persistent or chronic cough such as occurs with smoking, asthma, chronic bronchitis or emphysema	

Drug Facts (continued)	
• a sulfonamide drug	
Stop use and ask a doctor if • cough persists for more than 7 weeks, tends to recur, or is accompanied by fever, rash or persistent headache. A persistent cough may be a sign of a serious condition.	
If pregnant or breast-feeding, ask a health professional before use. Keep out of reach of children. In case of overdose, get medical help or contact a Poison Control Center right away.	
Directions • Only use the dose cup provided • Do not exceed 6 doses per 24 hrs Adults & children 12 yrs & over: 30 mL every 4 hrs Children 6 to under 12 yrs: 15 mL every 4 hrs Children 4 to under 6 yrs: 7.5 mL every 4 hrs Children under 4 yrs: do not use	
Other information • each 7.5 mL contains sodium 22 mg • store at room temperature 20°C	
Inactive ingredients (also see FD&C Red No. 40, flavors, glycerin, propylene glycol, saccharin sodium, sodium benzoate, sodium citrate, sodium citrate, sorbitol, xanthan gum, water)	
Questions? 1-800-368-3683	
<p>IMPORTANTE: EVITE el uso de este producto si está tomando un inhibidor de la monoaminoxidasa (MAOI) (algunos medicamentos para la depresión, hipertensión pulmonar y enfermedades a enfermedad de Parkinson) por 2 semanas después de suspender el medicamento MAOI. Si no sabe si su medicamento recetado contiene un MAOI, consulte con un médico o farmacéutico antes de tomar este producto.</p> <p>Evite el uso de alcohol cuando use un medicamento</p> <p>Si los datos más de una semana, ferre o sople o está acompañado de ferre, sangrado o dolor de cabeza persistente. La tos persistente puede ser un síntoma de una condición más grave.</p> <p>Evite el uso de bebidas y alimentos, consulte con un profesional de la salud antes de utilizar el producto.</p> <p>Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de sobredosis, busque ayuda médica o acompañe de inmediato con un Centro de Control de Envenenamiento.</p>	
<p>CONSEJO PARA PADRES/PARENTS: Evite el uso de este medicamento si está tomando un inhibidor de la monoaminoxidasa (MAOI) (algunos medicamentos para la depresión, hipertensión pulmonar y enfermedades a enfermedad de Parkinson) por 2 semanas después de suspender el medicamento MAOI. Si no sabe si su medicamento recetado contiene un MAOI, consulte con un médico o farmacéutico antes de tomar este medicamento.</p> <p>Evite el uso de alcohol cuando use un medicamento</p> <p>Si los datos más de una semana, ferre o sople o está acompañado de ferre, sangrado o dolor de cabeza persistente. La tos persistente puede ser un síntoma de una condición más grave.</p> <p>Evite el uso de bebidas y alimentos, consulte con un profesional de la salud antes de utilizar el producto.</p> <p>Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de sobredosis, busque ayuda médica o acompañe de inmediato con un Centro de Control de Envenenamiento.</p>	
<p>3 239000411 0</p> <p>Pharmacia www.vicks.com pharmacia.com</p> <p>Pharmacia www.vicks.com pharmacia.com</p> <p>Pharmacia www.vicks.com pharmacia.com</p> <p>Pharmacia www.vicks.com pharmacia.com</p>	

VICKS JARABE COUGH CONGESTION

dextromethorphan hbr and guaifenesin liquid

Product Information

Product Type	HUMAN OTC DRUG	Item Code (Source)	NDC:37000-959
Route of Administration	ORAL		

Active Ingredient/Active Moiety

Ingredient Name	Basis of Strength	Strength
DEXTROMETHORPHAN HYDROBROMIDE (UNII: 9D2RT19KYH) (DEXTROMETHORPHAN - UNII:7355X3ROTS)	DEXTROMETHORPHAN HYDROBROMIDE	5 mg in 7.5 mL
GUAIFENESIN (UNII: 495W7451VQ) (GUAIFENESIN - UNII:495W7451VQ)	GUAIFENESIN	100 mg in 7.5 mL

Inactive Ingredients

Ingredient Name	Strength
SODIUM CHLORIDE (UNII: 451W471Q8X)	
GLYCERIN (UNII: PDC6A3C0OX)	
SODIUM BENZOATE (UNII: OJ245FE5EU)	
SORBITOL (UNII: 506T60A25R)	
XANTHAN GUM (UNII: TTV12P4NEE)	
ANHYDROUS CITRIC ACID (UNII: XF417D3PSL)	
PROPYLENE GLYCOL (UNII: 6DC9Q167V3)	
WATER (UNII: 059QF0KO0R)	
SACCHARIN SODIUM (UNII: SB8ZUX40TY)	
SODIUM CITRATE (UNII: 1Q73Q2JULR)	
FD&C RED NO. 40 (UNII: WZB9127XOA)	

Product Characteristics

Color	red	Score	
Shape		Size	
Flavor	CHERRY	Imprint Code	
Contains			

Packaging

#	Item Code	Package Description	Marketing Start Date	Marketing End Date
1	NDC:37000-959-08	236 mL in 1 BOTTLE, PLASTIC; Type 0: Not a Combination Product	03/23/2020	

Marketing Information

Marketing Category	Application Number or Monograph Citation	Marketing Start Date	Marketing End Date
OTC Monograph Drug	M012	03/23/2020	

Labeler - The Procter & Gamble Manufacturing Company (004238200)

Revised: 10/2023

The Procter & Gamble Manufacturing Company