

CICLOFERON- benzalkonium chloride and lidocaine hydrochloride gel

Marcas USA LLC

Disclaimer: Most OTC drugs are not reviewed and approved by FDA, however they may be marketed if they comply with applicable regulations and policies. FDA has not evaluated whether this product complies.

Drug Facts

<i>Active ingredients</i>	<i>Purpose</i>
Benzalkonium Chloride 0.13%	Topical antiseptic
Lidocaine Hydrochloride 2%	Topical analgesic

Uses

- provides temporary relief of pain associated with cold sores and fever blisters
- first aid to help protect against infection in minor cuts, scrapes, burns

Warnings

For external use only

Do not use in the eyes or apply over large areas of the body. In case of deep puncture wounds, animal bites, or serious burns, consult a doctor.

Do not use

- for more than 7 days unless told to do so by a doctor
- more than directed
- if you are allergic to any ingredient in this product

When using this product

- avoid contact with the eyes

Stop use and ask a doctor if

- condition worsens
- symptoms last more than 7 days or clear up and occur again within a few days
- swelling, rash or fever develops

Keep out of reach of children

If swallowed, get medical help or contact a Poison Control Center immediately.

Directions

- clean the affected area
- apply a small amount of this product to the affected area 1 to 3 times daily
- may be covered with a sterile bandage
- children under 12 years of age, consult a doctor

Other Information

store at 20° to 25°C (68° to 77°F)

Inactive Ingredients

hypromellose, methylparaben, propylene glycol, water, polysorbate 80

Manufactured by/Hecho en México por:

LABORATORIOS LIOMONT, S.A. DE C.V.

A. López Mateos 68. Cuajimalpa 05000

México, DF

Distributed by/Distribuido por: **Marcas USA, LLC**

El Segundo, CA 90245

Questions? Call Toll-Free 1-800-428-9489

¿Preguntas? Llame Gratis al 1-800-428-9489

Datos de Medicamento

<i>Ingredientes Activos</i>	<i>Propósito</i>
Cloruro de Benzalkonio 0.13%	Antiséptico tópico
Clorhidrato de Lidocaina 2%	Analgésico tópico

Usos

- alivio temporal del dolor asociado con el herpes labial y ampollas de fiebre
- primeros auxilios para ayudar a proteger contra la infección de cortes, raspaduras y quemaduras menores

Precauciones

Sólo para uso externo:

No usar en los ojos ni aplique sobre grandes zonas de el cuerpo. En caso de heridas punzantes profundas, mordeduras de animales o quemaduras graves, consulte a un médico.

No se use

- por más de 7 días a menos que así lo indique un médico
- más de lo indicado
- si usted es alérgico a cualquiera de los ingredientes de este producto

Al utilizar este producto

- evite el contacto con los ojos

Suspenda su uso y consulte a su médico si

- la condición empeora
- los síntomas no desaparecen en 7 días o reaparecen a los pocos días
- desarrolla hinchazón, comezón o fiebre

Mantener fuera del alcance de los niños.

En caso de ingerir el producto obtenga ayuda médica o contacte a un Poison Control Center inmediatamente.

Modo de Empleo

- limpiar el área afectada
- Aplique una pequeña cantidad de este producto en la área afectada de 1 a 3 veces al día
- pueden ser cubiertos con un vendaje estéril
- niños menores de 12 años de edad, consulte a un médico

Otra información

mantenga a una temperatura de 20° a 25°C (68° a 77°F)

Ingredientes Inactivos

hipromelosa, metilparabeno, propilenglicol, agua, polisorbato 80

Manufactured by/Hecho en México por:

LABORATORIOS LIOMONT, S.A. DE C.V.

A. López Mateos 68. Cuajimalpa 05000

México, DF

Distributed by/Distribuido por: **Marcas USA, LLC**

El Segundo, CA 90245

Questions? Call Toll-Free 1-800-428-9489

¿Preguntas? Llame Gratis al 1-800-428-9489

PRINCIPAL DISPLAY PANEL

FAST PAIN RELIEF

ALIVIO RÁPIDO DEL DOLOR

CLEAR GEL APPLIES INVISIBLE

GEL TRANSPARENTE APLICA INVISIBLE

NDC 75940-122-04

Net wt 0.14oz / Peso Neto 4g

Clear Gel

CICLOFERON®

COLD SORE

treatment

tratamiento para

FUEGOS

Manufactured by/Hecho en México por:

LABORATORIOS LIOMONT, S.A. DE C.V.

A. López Mateos 68. Cuajimalpa 05000

México, DF

Distributed by/Distribuido por:

Marcas USA, LLC

El Segundo, CA 90245

Questions? Call Toll-Free 1-800-428-9489

¿Preguntas? Llame Gratis al 1-800-428-9489

Drug Facts		Datos de Medicamento	
Active Ingredients	Purpose	Ingredientes Activos	Propósito
Benzocaine Chloride 0.13% Lidocaine Hydrochloride 2%	Topical anesthetic Topical anesthetic	Cloruro de Benzocaina 0.13% Clorhidrato de Lidocaína 2%	Analgésico tópico Analgésico tópico
Uses • provides temporary relief of pain associated with cold sores and fever blisters • first aid to help protect against infection in minor cuts, scrapes, burns		Usos • alivio temporal del dolor asociado con el herpes labial y ampollas de fiebre • primeros auxilios para ayudar a proteger contra la infección de cortes, raspaduras y quemaduras menores	
Warnings For external use only: Do not use in the eyes or apply over large areas of the body. In case of deep puncture wounds, animal bites, or serious burns, consult a doctor. Do not use • for more than 7 days unless told to do so by a doctor • more than directed • if you are allergic to any ingredient in this product		Precauciones Sólo para uso externo: No usar en los ojos ni aplicar sobre grandes zonas de el cuerpo. En caso de heridas punzantes (profundas), mordeduras de animales o quemaduras graves, consulte a un médico. No se use • por más de 7 días a menos que así lo indique un médico • más de lo indicado • si usted es alérgico a cualquiera de los ingredientes de este producto	
When using this product • avoid contact with the eyes		Al utilizar este producto • evite el contacto con los ojos	
Stop use and ask a doctor if • condition worsens • symptoms last more than 7 days or clear up and occur again within a few days • swelling, rash or fever develops		Suspenda su uso y consulte a su médico si • la condición empeora • los síntomas no desaparecen en 7 días o reaparecen a los pocos días • desarrollo hinchazón, coqueción o fiebre	
Keep out of reach of children If swallowed, get medical help or contact a Poison Control Center immediately.		Mantener fuera del alcance de los niños En caso de ingerir el producto obtenga ayuda médica o contacte a un Poison Control Center inmediatamente.	
Directions • clean the affected area • apply a small amount of this product to the affected area 1 to 3 times daily • may be covered with a sterile bandage • children under 12 years of age, consult a doctor		Modo de Empleo • limpiar el área afectada • Aplique una pequeña cantidad de este producto en la área afectada de 1 a 3 veces al día • pueden ser cubiertas con un vendaje estéril • niños menores de 12 años de edad, consulte a un médico	
Other Information • store at 20° to 25° C (68° to 77°F)		Otra Información • mantenga a una temperatura de 20° a 25°C (68° to 77°F)	
Inactive Ingredients hydroxylose, methylparaben, propylene glycol, water, polysorbate 80		Ingredientes Inactivos hidroxilosa, metilparabeno, propilenglicol, agua, polisorbato 80	

Manufactured by/Hecho en México, por:
LABORATORIOS LIOMONT, S.A. DE C.V.
A. López Mateos 66, Cuajimalpa 05000
México, D.F.
Distributed by/Distribuido por:
MarexUSA, LLC
El Segundo, CA 90245
Questions? Call Toll-Free 1-800-428-9489
Preguntas? Llame Gratis al 1-800-428-9489



CICLOFERON®
Clear Gel

COLD SORE treatment
tratamiento para FUEGOS



NDC 75940-122-04
Net Wt. 0.14oz / Peso Neto 4g

FAST PAIN RELIEF
ALIVIO RÁPIDO DEL DOLOR

CLEAR GEL APPLIES INVISIBLE
GEL TRANSPARENTE APLICA INVISIBLE

2X Medicine
Cicloferon
NDC 75940-122-05
LIOMONT

0.13% benzalkonium chloride/2% lidocaine hydrochloride

COLD SORE Treatment / Tratamiento para FUEGOS

RAPIDRELIEV[™] FORMULA

Relieves Pain AND Fights Virus

INSTANT RELIEF from Pain

CLINICAL PROVEN to reduce spread of cold sores

CLEAR GEL invisible and odorless

Net wt 4g (.14 oz)



2X Medicine

NDC 75940-122-05
LIDMONT

CICLOFERON[®]

.13% benzalkonium chloride / 2% lidocaine hydrochloride
COLD SORE Treatment / Tratamiento para FUEGOS

RapidRelief[™] FORMULA
Relieves Pain **AND** Fights Virus

INSTANT RELIEF
from pain

CLINICALLY PROVEN
to reduce spread of cold sores

CLEAR GEL
invisible and odorless

Net wt 4g (.14 oz)

LIDMONT
4800034

Exp. Date: _____
Lot #: _____

Medix Medic Research, Inc.
LABORATORIOS LIDMONT S.A. DE C.V.
A. J. BARRON DE ALBA 1220000
MEXICO, D.F.
Dr. B. Barron de Alba, M.D.
Medix, LLC
New York, C. Adams
Medix, LLC
Quest for Total Relief 1800-438-6939
Preguntas Llame al 1800-438-6939



CICLOFERON

benzalkonium chloride and lidocaine hydrochloride gel

Product Information

Product Type	HUMAN OTC DRUG	Item Code (Source)	NDC:75940-122
Route of Administration	TOPICAL		

Active Ingredient/Active Moiety

Ingredient Name	Basis of Strength	Strength
BENZALKONIUM CHLORIDE (UNII: F5UM2KM3W7) (BENZALKONIUM - UNII:7N6JUD5X6Y)	BENZALKONIUM CHLORIDE	1.3 mg in 1 g
LIDOCAINE HYDROCHLORIDE (UNII: V13007Z41A) (LIDOCAINE - UNII:98PI200987)	LIDOCAINE HYDROCHLORIDE ANHYDROUS	20 mg in 1 g

Inactive Ingredients

Ingredient Name	Strength
HYPROMELLOSES (UNII: 3NXW29V3WO)	
METHYLPARABEN (UNII: A2I8C7HI9T)	
PROPYLENE GLYCOL (UNII: 6DC9Q167V3)	
WATER (UNII: 059QF0K00R)	
POLYSORBATE 80 (UNII: 6OZP39ZG8H)	

Packaging

#	Item Code	Package Description	Marketing Start Date	Marketing End Date

1	NDC:75940-122-02	1 in 1 CARTON	08/01/2011	
1		2 g in 1 TUBE; Type 0: Not a Combination Product		
2	NDC:75940-122-04	1 in 1 CARTON	08/01/2011	
2		4 g in 1 TUBE; Type 0: Not a Combination Product		
3	NDC:75940-122-05	1 in 1 CONTAINER	02/01/2018	
3		4 g in 1 TUBE; Type 0: Not a Combination Product		

Marketing Information

Marketing Category	Application Number or Monograph Citation	Marketing Start Date	Marketing End Date
OTC monograph not final	part333A	08/01/2011	

Labeler - MarcasUSA LLC (016139820)

Registrant - MarcasUSA LLC (016139820)

Establishment

Name	Address	ID/FEI	Business Operations
Laboratorios Liomont, S.A. de C.V.		814377396	manufacture(75940-122)

Revised: 12/2019

MarcasUSA LLC