

GREEN GUARD ADVANCED SINUS RELIEF- acetaminophen, phenylephrine hydrochloride tablet

Unifirst First Aid Corporation

Disclaimer: Most OTC drugs are not reviewed and approved by FDA, however they may be marketed if they comply with applicable regulations and policies. FDA has not evaluated whether this product complies.

819R Green Guard Advanced Sinus Relief

Drug Facts

Active ingredients (in each tablet)

Acetaminophen 500 mg

Phenylephrine HCl 5 mg

Purpose

Pain reliever/fever reducer

Nasal decongestant

Uses

temporarily relieves these common cold/flu symptoms:

- nasal congestion
- headache
- minor aches and pains
- stuffy nose
- sinus congestion and pressure

temporarily reduces fever

Warnings

Liver warning: This product contains acetaminophen. Severe liver damage may occur if you take:

- more than 4,000 mg of acetaminophen in 24 hours
- with other drugs containing acetaminophen
- 3 or more alcoholic drinks every day while using this product

Allergy alert:

Acetaminophen may cause severe skin reactions. Symptoms may include:

- skin reddening
- blisters
- rash

If a skin reaction occurs, stop use and seek medical help right away.

Do not use

- with any other drug containing acetaminophen (prescription or nonprescription). If you are not sure whether a drug contains acetaminophen, ask a doctor or

pharmacist.

- if you are now taking a prescription monoamine oxidase inhibitor (MAOI) (certain drugs for depression, psychiatric or emotional conditions, or Parkinson's disease), or for 2 weeks after stopping the MAOI drug. If you do not know if your prescription drug contains an MAOI, ask a doctor or pharmacist before taking this product.
- for more than 10 days unless directed by a doctor

Ask a doctor before use if you have

- liver disease
- thyroid disease
- diabetes
- high blood pressure
- heart disease
- trouble urinating due to an enlarged prostate gland

Ask a doctor or pharmacist before use if you are

- taking the blood thinning drug warfarin

When using this product do not exceed recommended dosage.

Stop use and ask a doctor if

- you get nervous, dizzy, or sleepless
- pain or nasal congestion gets worse or lasts more than 7 days
- fever gets worse or lasts more than 3 days
- redness or swelling is present
- new symptoms appear

These could be signs of a serious condition.

If pregnant or breast-feeding, ask a health professional before use.

Keep out of reach of children.

Overdose warning:

In case of overdose, get medical help or contact a Poison Control Center right away (1-800-222-1222).

Quick medical attention is critical for adults as well as for children even if you do not notice any signs or symptoms.

Directions

■ do not use more than directed

Adults and children: (12 years and over) Take 2 tablets every 6 hours. Do not take more than 8 tablets in 24 hours.

Children under 12 years: Ask a doctor

Other information

- store at room temperature 59°-86°F (15°-30°C)
- tamper evident sealed packets
- do not use any opened or torn packets
- avoid excessive heat and humidity

Inactive ingredients

corn starch, crospovidone, hypromellose, microcrystalline cellulose, polyethylene glycol, povidone, pregelatinized starch, stearic acid.

Questions or comments? 1-800-869-6970

Advanced Sinus relief™

Acetaminophen 500mg/Acetaminofeno 500mg

Phenylephrine HCl 5mg/Fenilefrina HCl 5mg

Tabletas mejoradas para el alivio sinusal

Pain Reliever & Fever Reducer & Nasal Decongestant / Alivia el dolor y reduce la fiebre y descongestivo nasal

Pull to Open

Tire Para Abrir

GREEN GUARD®

50 Packets of 2 Tablets

100 Tablets

Order #2206

Distributed by Green Guard®, St Louis, MO 63045

CONSERVE LA CARTA PARA OBTENER LA INFORMACIÓN COMPLETA DEL PRODUCTO

Información del medicamento (continuación)

Debe tomar este medicamento y consultar con el médico si:

- se produce náuseas, vómitos, mareo o dificultad para dormir
- el dolor o la congestión nasal empeora o persiste por más de 7 días
- presenta fiebre o persiste por más de 3 días
- presenta hinchazón o enrojecimiento
- aparecen nuevos síntomas.

Estas pueden ser señales de serios padecimientos.

Si está embarazada o en periodo de lactancia, consulte la opinión de un médico antes de comenzar.

Mantenga este y otros medicamentos fuera del alcance de los niños.

Advertencia de sobredosis: En caso de ocurrir una sobredosis, como consecuencia de inmediato con un médico o llame a un centro de control de envenenamientos (1-800-222-1222). La información médica es crítica tanto para los niños como para los adultos.

Indicaciones

Alivio de la fiebre y del dolor Tomar 2 tabletas cada 6 horas. No consumir más de 8 tabletas en 24 horas.

Alivio de la congestión nasal Tomar 2 tabletas cada 6 horas. No consumir más de 8 tabletas en 24 horas.

Otra información

- **Contraindicaciones:** Contraindicado en pacientes con insuficiencia renal, insuficiencia hepática, hipertensión, diabetes, asma, epilepsia, glaucoma, miastenia gravis, uso de alcohol, uso de otros medicamentos que contengan acetaminofeno.
- **Precauciones:** Evitar el uso de alcohol.
- **Interacciones:** Evitar el uso de alcohol.
- **Uso en niños:** Este medicamento está indicado para el uso en niños de 12 años de edad o mayores.
- **Uso en ancianos:** Este medicamento está indicado para el uso en ancianos de 65 años de edad o mayores.
- **Uso en embarazadas y lactantes:** Este medicamento está indicado para el uso en embarazadas y lactantes.
- **Uso en pacientes con problemas renales o hepáticos:** Este medicamento está indicado para el uso en pacientes con problemas renales o hepáticos.
- **Uso en pacientes con problemas de coagulación:** Este medicamento está indicado para el uso en pacientes con problemas de coagulación.
- **Uso en pacientes con problemas de visión:** Este medicamento está indicado para el uso en pacientes con problemas de visión.
- **Uso en pacientes con problemas de audición:** Este medicamento está indicado para el uso en pacientes con problemas de audición.
- **Uso en pacientes con problemas de habla:** Este medicamento está indicado para el uso en pacientes con problemas de habla.
- **Uso en pacientes con problemas de memoria:** Este medicamento está indicado para el uso en pacientes con problemas de memoria.
- **Uso en pacientes con problemas de concentración:** Este medicamento está indicado para el uso en pacientes con problemas de concentración.
- **Uso en pacientes con problemas de atención:** Este medicamento está indicado para el uso en pacientes con problemas de atención.
- **Uso en pacientes con problemas de razonamiento:** Este medicamento está indicado para el uso en pacientes con problemas de razonamiento.
- **Uso en pacientes con problemas de juicio:** Este medicamento está indicado para el uso en pacientes con problemas de juicio.
- **Uso en pacientes con problemas de toma de decisiones:** Este medicamento está indicado para el uso en pacientes con problemas de toma de decisiones.
- **Uso en pacientes con problemas de comportamiento:** Este medicamento está indicado para el uso en pacientes con problemas de comportamiento.
- **Uso en pacientes con problemas de emociones:** Este medicamento está indicado para el uso en pacientes con problemas de emociones.
- **Uso en pacientes con problemas de sentimientos:** Este medicamento está indicado para el uso en pacientes con problemas de sentimientos.
- **Uso en pacientes con problemas de actitudes:** Este medicamento está indicado para el uso en pacientes con problemas de actitudes.
- **Uso en pacientes con problemas de valores:** Este medicamento está indicado para el uso en pacientes con problemas de valores.
- **Uso en pacientes con problemas de principios:** Este medicamento está indicado para el uso en pacientes con problemas de principios.
- **Uso en pacientes con problemas de creencias:** Este medicamento está indicado para el uso en pacientes con problemas de creencias.
- **Uso en pacientes con problemas de ideas:** Este medicamento está indicado para el uso en pacientes con problemas de ideas.
- **Uso en pacientes con problemas de opiniones:** Este medicamento está indicado para el uso en pacientes con problemas de opiniones.
- **Uso en pacientes con problemas de puntos de vista:** Este medicamento está indicado para el uso en pacientes con problemas de puntos de vista.
- **Uso en pacientes con problemas de perspectivas:** Este medicamento está indicado para el uso en pacientes con problemas de perspectivas.
- **Uso en pacientes con problemas de enfoques:** Este medicamento está indicado para el uso en pacientes con problemas de enfoques.
- **Uso en pacientes con problemas de métodos:** Este medicamento está indicado para el uso en pacientes con problemas de métodos.
- **Uso en pacientes con problemas de técnicas:** Este medicamento está indicado para el uso en pacientes con problemas de técnicas.
- **Uso en pacientes con problemas de procedimientos:** Este medicamento está indicado para el uso en pacientes con problemas de procedimientos.
- **Uso en pacientes con problemas de prácticas:** Este medicamento está indicado para el uso en pacientes con problemas de prácticas.
- **Uso en pacientes con problemas de costumbres:** Este medicamento está indicado para el uso en pacientes con problemas de costumbres.
- **Uso en pacientes con problemas de hábitos:** Este medicamento está indicado para el uso en pacientes con problemas de hábitos.
- **Uso en pacientes con problemas de tradiciones:** Este medicamento está indicado para el uso en pacientes con problemas de tradiciones.
- **Uso en pacientes con problemas de rituales:** Este medicamento está indicado para el uso en pacientes con problemas de rituales.
- **Uso en pacientes con problemas de ceremonias:** Este medicamento está indicado para el uso en pacientes con problemas de ceremonias.
- **Uso en pacientes con problemas de ritos:** Este medicamento está indicado para el uso en pacientes con problemas de ritos.
- **Uso en pacientes con problemas de rituales:** Este medicamento está indicado para el uso en pacientes con problemas de rituales.
- **Uso en pacientes con problemas de ritos:** Este medicamento está indicado para el uso en pacientes con problemas de ritos.
- **Uso en pacientes con problemas de rituales:** Este medicamento está indicado para el uso en pacientes con problemas de rituales.
- **Uso en pacientes con problemas de ritos:** Este medicamento está indicado para el uso en pacientes con problemas de ritos.

ADVANCED Sinus relief

Pull to Open
Tire Para Abrir

Tabletas mejoradas para el alivio sinusal

Acetaminophen 500 mg/Acetaminofeno 500 mg
Phenylephrine HCl 5 mg/Fenilefrina HCl 5 mg

Pain Reliever/Fever Reducer & Nasal Decongestant
Alivia el dolor, reduce la fiebre y descongestivo nasal

GREEN GUARD

50 Packets of 2 Tablets
100 Tablets
Order #2206

Distributed by Green Guard®
St Louis, MO 63045

Información del medicamento (continuación)

Debe tomar este medicamento y consultar con el médico si:

- se produce náuseas, vómitos, mareo o dificultad para dormir
- el dolor o la congestión nasal empeora o persiste por más de 7 días
- presenta fiebre o persiste por más de 3 días
- presenta hinchazón o enrojecimiento
- aparecen nuevos síntomas.

Estas pueden ser señales de serios padecimientos.

Si está embarazada o en periodo de lactancia, consulte la opinión de un médico antes de comenzar.

Mantenga este y otros medicamentos fuera del alcance de los niños.

Advertencia de sobredosis: En caso de ocurrir una sobredosis, como consecuencia de inmediato con un médico o llame a un centro de control de envenenamientos (1-800-222-1222). La información médica es crítica tanto para los niños como para los adultos.

Indicaciones

Alivio de la fiebre y del dolor Tomar 2 tabletas cada 6 horas. No consumir más de 8 tabletas en 24 horas.

Alivio de la congestión nasal Tomar 2 tabletas cada 6 horas. No consumir más de 8 tabletas en 24 horas.

Otra información

- **Contraindicaciones:** Contraindicado en pacientes con insuficiencia renal, insuficiencia hepática, hipertensión, diabetes, asma, epilepsia, glaucoma, miastenia gravis, uso de alcohol, uso de otros medicamentos que contengan acetaminofeno.
- **Precauciones:** Evitar el uso de alcohol.
- **Interacciones:** Evitar el uso de alcohol.
- **Uso en niños:** Este medicamento está indicado para el uso en niños de 12 años de edad o mayores.
- **Uso en ancianos:** Este medicamento está indicado para el uso en ancianos de 65 años de edad o mayores.
- **Uso en embarazadas y lactantes:** Este medicamento está indicado para el uso en embarazadas y lactantes.
- **Uso en pacientes con problemas renales o hepáticos:** Este medicamento está indicado para el uso en pacientes con problemas renales o hepáticos.
- **Uso en pacientes con problemas de coagulación:** Este medicamento está indicado para el uso en pacientes con problemas de coagulación.
- **Uso en pacientes con problemas de visión:** Este medicamento está indicado para el uso en pacientes con problemas de visión.
- **Uso en pacientes con problemas de audición:** Este medicamento está indicado para el uso en pacientes con problemas de audición.
- **Uso en pacientes con problemas de habla:** Este medicamento está indicado para el uso en pacientes con problemas de habla.
- **Uso en pacientes con problemas de memoria:** Este medicamento está indicado para el uso en pacientes con problemas de memoria.
- **Uso en pacientes con problemas de concentración:** Este medicamento está indicado para el uso en pacientes con problemas de concentración.
- **Uso en pacientes con problemas de atención:** Este medicamento está indicado para el uso en pacientes con problemas de atención.
- **Uso en pacientes con problemas de razonamiento:** Este medicamento está indicado para el uso en pacientes con problemas de razonamiento.
- **Uso en pacientes con problemas de juicio:** Este medicamento está indicado para el uso en pacientes con problemas de juicio.
- **Uso en pacientes con problemas de toma de decisiones:** Este medicamento está indicado para el uso en pacientes con problemas de toma de decisiones.
- **Uso en pacientes con problemas de comportamiento:** Este medicamento está indicado para el uso en pacientes con problemas de comportamiento.
- **Uso en pacientes con problemas de emociones:** Este medicamento está indicado para el uso en pacientes con problemas de emociones.
- **Uso en pacientes con problemas de sentimientos:** Este medicamento está indicado para el uso en pacientes con problemas de sentimientos.
- **Uso en pacientes con problemas de actitudes:** Este medicamento está indicado para el uso en pacientes con problemas de actitudes.
- **Uso en pacientes con problemas de valores:** Este medicamento está indicado para el uso en pacientes con problemas de valores.
- **Uso en pacientes con problemas de principios:** Este medicamento está indicado para el uso en pacientes con problemas de principios.
- **Uso en pacientes con problemas de creencias:** Este medicamento está indicado para el uso en pacientes con problemas de creencias.
- **Uso en pacientes con problemas de ideas:** Este medicamento está indicado para el uso en pacientes con problemas de ideas.
- **Uso en pacientes con problemas de opiniones:** Este medicamento está indicado para el uso en pacientes con problemas de opiniones.
- **Uso en pacientes con problemas de puntos de vista:** Este medicamento está indicado para el uso en pacientes con problemas de puntos de vista.
- **Uso en pacientes con problemas de perspectivas:** Este medicamento está indicado para el uso en pacientes con problemas de perspectivas.
- **Uso en pacientes con problemas de enfoques:** Este medicamento está indicado para el uso en pacientes con problemas de enfoques.
- **Uso en pacientes con problemas de métodos:** Este medicamento está indicado para el uso en pacientes con problemas de métodos.
- **Uso en pacientes con problemas de técnicas:** Este medicamento está indicado para el uso en pacientes con problemas de técnicas.
- **Uso en pacientes con problemas de procedimientos:** Este medicamento está indicado para el uso en pacientes con problemas de procedimientos.
- **Uso en pacientes con problemas de prácticas:** Este medicamento está indicado para el uso en pacientes con problemas de prácticas.
- **Uso en pacientes con problemas de costumbres:** Este medicamento está indicado para el uso en pacientes con problemas de costumbres.
- **Uso en pacientes con problemas de hábitos:** Este medicamento está indicado para el uso en pacientes con problemas de hábitos.
- **Uso en pacientes con problemas de tradiciones:** Este medicamento está indicado para el uso en pacientes con problemas de tradiciones.
- **Uso en pacientes con problemas de rituales:** Este medicamento está indicado para el uso en pacientes con problemas de rituales.
- **Uso en pacientes con problemas de ritos:** Este medicamento está indicado para el uso en pacientes con problemas de ritos.
- **Uso en pacientes con problemas de rituales:** Este medicamento está indicado para el uso en pacientes con problemas de rituales.
- **Uso en pacientes con problemas de ritos:** Este medicamento está indicado para el uso en pacientes con problemas de ritos.

Drug Facts (continued)

Other information

- **Keep out of reach of children.**
- **Overdose warning:** In case of overdose, get medical help or contact a Poison Control Center right away (1-800-222-1222). Quick medical attention is critical for adults as well as for children even if you do not notice any signs or symptoms.
- **Directions**
- **Adults and Children (12 years and over):** Take 2 tablets every 6 hours. Do not take more than 8 tablets in 24 hours.
- **Children under 12 years:** Ask a doctor.

GREEN GUARD ADVANCED SINUS RELIEF

acetaminophen, phenylephrine hydrochloride tablet

Product Information	Product Type	Item Code (Source)	NDC:47682-001
	HUMAN OTC DRUG		

Route of Administration ORAL

Active Ingredient/Active Moiety

Ingredient Name	Basis of Strength	Strength
ACETAMINOPHEN (UNII: 362O9ITL9D) (ACETAMINOPHEN - UNII:362O9ITL9D)	ACETAMINOPHEN	500 mg
PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE (UNII: 04JA59TNSJ) (PHENYLEPHRINE - UNII:1WS297W6MV)	PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE	5 mg

Inactive Ingredients

Ingredient Name	Strength
CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE (UNII: OP1R32D61U)	
HYPROMELLOSES (UNII: 3NXW29V3WO)	
POLYETHYLENE GLYCOL, UNSPECIFIED (UNII: 3WJQ05DW1A)	
STARCH, CORN (UNII: O8232NY3SJ)	
STEARIC ACID (UNII: 4ELV7Z65AP)	
CROSPVIDONE (UNII: 68401960MK)	
POVIDONE, UNSPECIFIED (UNII: FZ989GH94E)	

Product Characteristics

Color	white (white)	Score	no score
Shape	ROUND (ROUND)	Size	12mm
Flavor		Imprint Code	AZ;261
Contains			

Packaging

#	Item Code	Package Description	Marketing Start Date	Marketing End Date
1	NDC:47682-001-33	50 in 1 BOX	12/30/2008	
1		2 in 1 PACKET; Type 0: Not a Combination Product		
2	NDC:47682-001-48	125 in 1 BOX	12/30/2008	
2	NDC:47682-001-99	2 in 1 PACKET; Type 0: Not a Combination Product		
3	NDC:47682-001-99	2 in 1 PACKET; Type 0: Not a Combination Product	12/30/2008	

Marketing Information

Marketing Category	Application Number or Monograph Citation	Marketing Start Date	Marketing End Date
OTC monograph final	part341	12/30/2008	

Labeler - Unifirst First Aid Corporation (832947092)

Revised: 3/2023

Unifirst First Aid Corporation